



RS Tamba, Yasuyori
180 Ishin ho
J3T3
1935
v.3

East Asia

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

問 顧

井上通泰先生
山田孝雄先生
新村出先生

正宗敦夫

編纂
校訂

醫心方

自九卷
至十三卷

合資
會社

日本古典全集刊行會壽梓



RS
180
J3T3
-1935
V.35



醫心方卷第九

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治欬^{シハフキ}嗽方第一

東三音

治喘^{ハキ}息方第二

充多及

治短氣方第三

ヤ丁又ヤ丁

治少氣方第四

治氣^キ壅方第五

於結及目痛也

治貴^{ヤ丁又ヤ丁}狂方第六

癖飲水漿便令停滯不能行更遇寒氣

治癖^キ食方第八

治胃^{モウ}反食方第九

又癖者治飲水漿便令停滯不能行更遇寒氣

治寒^コ冷不食方第十一

治上^コ熱下冷不食方第十二

治宿食不消方第十三

治惡心方第十四

治噫^{コロヤ}方第十五

治穀^{ホル}勞欲卧方第十六

治干^コ嘔方第十七

治臧^コ方第十八

治嘔^{モウ}吐方第十九

治干^コ嘔方第十七

治臧^コ方第十八

治欬^{シハフキ}嗽方第一

卷ノ

音火

金之精也

金ハ

病源論云欬嗽者音火肺感於寒微者則成欬嗽也ハ肺主氣合

者肝心脾肺腎也

於皮毛耶之初傷先客皮毛故肺先受之五藏与六府為表

者大腸小腸膽胃三腫

膀胱也

裏皆稟氣於肺以四時更王ハ五藏六府皆有欬嗽各以其時

ハ

感於寒而受病故欬嗽形證不同 五藏之欬者乘秋則肺

ハ

先受之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血乘夏則心受之

ハ

介唯中氣如咳又物塞心欬之狀則心痛唯中

ハ

如哽甚則咽腫唯痺乘春則受

ハ

肝之肝欬之狀則兩脇下痛甚則不可以轉兩脚下滿乘至

陰則脾受之脾欬之狀欬則右脇下痛瘠引於髀背甚

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

則不可動之則欬乘冬則腎受之腎欬之狀欬則腰背相引

時思及水之精也

而痛甚則欬^{シタナヨリ}涎^{シタナヨリ}此五藏之欬也五藏欬久不已傳與六府脾欬

不已則胃受之胃欬之狀^{ウ延口液出也}欬而臨^{ウカハフ}甚則長虫出肝欬不已

則膽受之膽欬之狀^{ホノホノ}臨膽汁肺欬不已大腸受之太腸欬^{ウホノ}

之狀^{ホノホノ}欬而遺屎心欬不已則小腸受之小腸欬之狀^{又云オホホノ}欬而失氣

者與欬俱腎欬不已勝^{ホノホノ}胱受之勝^{又云オホホノ}胱欬之狀^{又云オホホノ}欬而遺尿久欬

不已三^{ホノホノ}睪受之三睪^{又云オホホノ}欬者而腸滿不欲食飲此皆聚於胃^{又云オホホノ}關

於肺^{ホノホノ}使人多涕唾而面浮腫氣逆也^{又云オホホノ}

千金方云問云欬病有十何謂師曰有風欬有寒欬有支

欬有肝欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有

上腫中腫下腫
謂之三腫
魚音

胃之心
木之精也

俾移反

時刃字反

厥陰效

問早效之語目效言不證以何為異師曰

欲語目效言不得竟謂之風效飲冷食寒目之而

效謂之寒效心下堅滿效則引痛其脉又遲謂之

支效引脇下痛謂之肝效而吐血引手少陰謂

之心效如涎出瀆沫下引少腹謂之脾效引頸項

而唾涎沫謂之肺效而耳無所聞引腰脊謂之腎效

而引口中頭痛口苦謂之膽效而引舌本謂之厥

陰效

僧深方云熱效唾黏而如粉冷效唾清澄如水醫門

瘰癧居井二反

胡諱反

頸在後

頸在前

方云夫酒客嗽者其人必吐血此為坐極飲過度所致難療
槌要方云病有數種有冷熱嗽嗽有肺萎嗽有肺癰
嗽有水氣嗽若有本性非熱遇諸冷緣而得嗽觸冷
便發熱遇即可此是冷嗽也若有本性非冷遇諸熱緣
而得嗽觸熱便發遇冷即可此是熱嗽也若本性多熱
又久熱將息更劇冷將息無効每唾無多濃澆痰
但唾白而稠惣是细小泡沫此是肺萎嗽也若本性
冷熱將息無効每嗽所出皆是濃澆如肺瘡中膿或寒
或熱此是肺癰嗽也若有非冷熱非經久患嗽上氣喘

息腹滿悶甚者頭面有氣過久重者身軀皆腫此是水

氣欬也 葛氏方云上氣喘嗽肩息不得卧手足逆冷

及面浮腫者死 僧深方紫菀丸治咳上氣喘息多唾息

方紫菀 欬冬花 細辛 甘草 干薑 各二兩 右五物

丸如梧子三九先食服日三又方如櫻桃大含丸稍咽其

汁日三新久味晝夜不得卧咽中水鷄聲欬死者治之甚良

今案著婆方為散 錄驗方小紫菀丸治上氣夜咳達多濁唾

方 干薑二兩 甘草二兩 細辛二兩 紫菀三分

欬冬花二兩 附子二兩 凡六物下篩蜜和丸如梧子

先食服五九日二モ

大紫莞丸治上氣欬逆方

紫莞二兩

五味子二兩セネカウラ

橘皮二兩又云青皮

香豉二兩是義及

干薑二兩

桂心二兩

杏人二兩カラモノセネ

細辛二兩キナツヒアヒクセ

甘草二兩

款冬花二兩ヤフマキ

食茱萸二兩シホワラフキ

九十一物鵲巢蜜和丸如梧子ハカリシ一服五九日二夜ヤラ含シ一丸如杏功効与是茶茱萸同

核大咽汁畫更含セネセウフクメ

垂祖方治上氣咳唾杏人丸方

杏人二升カラモノセネ葵イシ

干薑二兩

細辛二兩キナツヒアヒクセ

紫莞二兩

桂心二兩

鵲巢セネシ下篩杏人別如暗合ヤラ和以蜜丸ヤラ服如棗核一枚日三廣ハカリ

浴方療咽喉乾燥欬軟語無聲桂心散方

三

四

桂心六兩 杏人三兩 檮節以綿裹一乘大含細と咀汁日

三夜二忌生葱油膩 范汪方治欬紫莞牙上丸方

紫莞一分 一方 乾薑一分 附子一分 桂心一分 欬東花分

細辛一分 凡六物治瘧和蜜丸 如小豆先食以二丸著牙

上稍日再不知稍增 又云椶枹湯治久欬上氣訇中寒

冷不能得食飲卧不安床牽繩而起 咽中如水鷄聲方

欬東花卅枚 一方 細辛一兩 紫莞二兩 一方 甘草二兩 一方

五味半升 一方大棗 杏人卅枚 半夏半升 洗一方 桂心二兩 麻黃

吹咀 二兩 一方 干薑二兩 凡十物吹咀以水八升煮得二升先食適

上扶兩及下才与又 醫也

金寒也

水鷄 似鴨也 恒在水中 見人即入 後即出 也又名 鷄鴨也 其鳴聲 似鷄也

寒温再服温卧汗出即愈今案錄驗方麻黄三兩甘草三兩杏仁百枚凡三物切以

水六升煮取二升五合未食前三服

小品方治嗽上氣呼吸攀繩肩息欲死覆杯湯方

麻黄四兩 甘草二兩 干薑二兩 桂肉二兩 貝母二兩

貝母陶景注云秋似燕貝子故名之

五物以水八升煮取二升再服即愈今案范汪方云苗詭士孫栗男兒四歲極啼已多飲水得上氣喘息欲死師灸之与五苓湯不差苗与谷此覆杯湯兒不能飲母稍与含之一夜至明盡得愈又云浚雪

湯治上氣不得息卧喉中如水鷄聲氣欲絕方麻黄

細辛二兩 五味子半升 干薑四兩 半夏四兩 桂心兩 凡六物

以水一斗煮取三升分服一升投杯即得卧一名投杯湯令

聖方卷乙

得汗多喜不得眠汗者

アセアエハキト

一服消息後服

今案經心方云麻黃湯五苓半作桂心三兩杏仁

三兩細辛三兩生薑兩

半復四兩七物以水可五合服漸しかり

千金方云夫酒客

飲者必致吐逆坐極飲過多所致厚朴大黃湯主之厚朴

ホカシハクニ

一尺大黃六兩

オホシ

枳實四兩

カフタチツア

三味水五升

煮取二升分再服之

本草云欬逆厥癰以酒服之甚良

又云獐主膏酒和

三合服之曰三

又云食鯉魚肉也

崔禹作鯉音他端又

孟詵食經云

療卒咳味方

梨一顆剉作五孔每孔

中內一粒

枳實

麴裹於熱灰中燒令極熟出停冷割食

之

今案樞要方梨七果取汁白錫一兩徒當及飽嚼之

又方梨去核內蘗蜜麵

今案手

裹燒令熟食之太良ハミヤ又方割梨肉於藥蘖中煎之停冷

食之ハ今案朱思簡今案朱思簡食經云凡用梨治食經云凡用梨治葛氏方治卒得欬嗽方

皂莢カシナ干薑桂心カシナ系小鳩丸カシナ三九日三又方生薑汁百部汁カシナ

和煎服二合カシナ集驗方治忽暴氣喘奔急坐卧不得并カシナ

唯裏呼聲氣欬絕方カシナ麻黃三兩カシナ杏人四兩カシナ干薑カシナ

藥二兩カシナ紫胡四兩カシナ橘皮二兩カシナ切以水六升煮取二升半カシナ

分三服カシナ張仲景方治卅年欬太藥丸方カシナ大棗百枚カシナ杏人カシナ

百枚カシナ豉百枚カシナ凡三物カシナ或杏人カシナ鳩令相得乃內棗カシナ鳩令熟カシナ

和調丸如棗核カシナ一九含之カシナ稍咽汁日二漸增之カシナ常用良カシナ

醫方

耆婆方治^{ハル}年咳^{ハル}嗽方 細辛紫莞 麻黃甘草干薑

各^ハ四^ハ 五味為散白飲^{ヨハシク}服^メ一方寸匕日三^{カヒ}

効驗方欬冬花^ハ分九治^ハ年^ハ嗽^ハ上氣欬^ハ逆面腫方杏仁^{カラモツネ}

三分^ハ 葵^イ 干薑三兩^ハ 甘草一兩^ハ 麻黃三兩^ハ 甘草二兩^ハ 欬冬^{ヤブツネ}

花二兩^ハ 凡六物治^{ククキ}下^ハ節^ハ以蜜和丸如梧子先食服三丸日三^ハ

僧深方治新久^ハ嗽^ハ花^ハ煎方^ハ花^ハ二兩^ハ 乾薑三兩^ハ

白蜜二升^ハ 凡三物內^ハ於蜜中^ハ微火煎服^ハ如棗核一枚日三^ハ

董^フ欬^ハ嗽^ハ法 錄鈴方治久^ハ嗽^ハ勲^ハ法 燭^ハ紙^ハ一^ハ張^ハ熟^ハ艾^ハ薄^ハ

布^ハ遍^ハ紙^ハ上^ハ勲^ハ黃^ハ末^ハ一^ハ兩^ハ欬^ハ東^ハ花^ハ末^ハ二^ハ分^ハ前^ハ遍^ハ布^ハ艾^ハ上^ハ著^ハ一^ハ

葦筒卷之寸列シテ以繩繫之燒下頭ヤシモウハシ欲烟取三寸烟亦

可レ咀咽ツム欲計分ラム差イハ欲盡刮一百日斷ツグ塩及酢今葉本草雄

千食方治フル効董法ニカフル細熟艾薄布紙上紙廣四寸度以ナラハ黃

末薄布艾上シキヲモヤ發令調均ス以荻杖ヤシ如紙長卷之ナカセ截作十枚先

以燒紙下去荻烟從孔出口取烟之取ツグ心明日復董作フル

日餘者後日復董之三日心自然差得食白糜餘皆禁之カシ

灸効味法

僧深方云灸ヤス近兩乳下黑白穴際文百壯即日愈汪

方同又方以繩當乳頭團周身令前後平正當乳脊

之方心方長乙

骨解中灸之九十壯 又方橫度口中折繩從脊灸兩

邊灸八十壯三日報畢 又方從大椎數下行第五節下

第六節上穴間中一處灸隨年壯并治上氣秘方小品方云

灸肩井穴百壯在肩上陷解中大骨前 又方灸大杼穴

隨年壯在項第一椎下兩旁各一寸半陷者中 又方灸

肺俞隨年壯在第三椎下兩旁各一寸半 又方灸風門熱

府穴百壯在第二椎下兩旁各一寸半 又方灸天窗

穴五十壯在結喉下五寸宛之中 又方灸玉堂穴百壯在紫宮

下一寸六分 又方灸臍中穴五十壯在玉堂下一寸六分兩乳間陷者

中又方灸雲門穴五十壯在巨脊下氣戶兩旁各二寸陷者中

橫去旋旁六寸機又方灸中府穴五十壯肺募也在雲門下一寸

又方灸巨闕穴五十壯在鳩尾穴下五分在臆前蔽骨下五分有鳩尾者當從臆前骨又方灸期門穴五十

壯在去巨闕五分骨臆前骨名也和名分示又方灸輸府穴在旋機旁

各二寸又方灸或中穴在輸府下一寸六分又方灸氣戶穴在

去旋機旁各四寸

葛氏方云度手母指中折以度心下灸三壯即差

治喘息方第二

病源論云肺主氣耶乘於肺則貽脹今兒則肺管不利也則

腎心方卷九

猪膏及腹滿也

鳩尾
更取
為鳩
骨下
此下
寸

氣道濕故氣上喘逆鳴息不通也 葛氏方治卒上氣

鳴息便欲他方 搗莖絞飲汁一升許立愈 又方米人參服

方寸匕日三 又方桑根白皮細切三升生薑切半升吳茱萸

半升酒五升合煮三沸去滓盡服之入口則氣下此千金秘

方 極要方療上氣逆滿喘急不通呼吸欲死救命湯方

麻黃八兩 甘草四兩 大棗卅枚 夜干如博子三枚右以井

花水一斗煮麻黃并沸內餘藥煮取四升分四服入口即愈

腎門方治上氣喘急不得卧身面腫小便澀方 亭歷

一兩 大棗卅枚 水三升煮取一升內亭歷煮五六沸

如泥

水

取

頤服微利シイエヌ毫

効驗方遊氣湯治上氣一來一去九常緩

急不足不得飲食九不得眠方生薑八兩厚朴ホカシ蜀カフホク人參カフホク二兩

伏苓フツゼン四兩桂心五兩ホククニ半夏ホククニ一升ホククニ枳實シツジツ子五枚シツジツ甘草二兩シツジツ

黃芩ワウキン三兩ハ凡九物切以水一斗煮取四升ハ服七合日三

錄驗方大棗湯治上氣胃寒咽中如水ハ雞聲方

欬ヤフスキ冬花ヤフスキ枝ヤフスキ細辛アウシ四分桂心アウシ四分麻黃カネクモ四兩大棗オホナメ廿枚甘草オホナメ蜀オホナメ

杏人カラモウ枝セネ紫莞フナ四分生薑ホククニ十兩半夏ホククニ三升十味以

水八升煮取二升頤服卧令汗食糜粥數日餘皆禁便愈

新錄方治上氣喉中水雞鳴方オホナメ桑根白皮オホナメ一升生薑オホナメ合

賢心方オホナメ

乙

皮切一升以水四升煮取一升六合二服又方冷水漬足溫易之イマ

又云上氣身面浮腫小便澀喘息不得卧方高麗子ハワカサ十八イカサ杏仁アミナナ

四分イシ大棗肉オホクサ五分三物合搗三四千杵可丸飲漿カサ如梧子カサ七九日二

加至十九ル以小便ル為度此方大安穩兼去水腫滿者又方以桑根クサネ

汁一斗煮赤アカ小豆アハキ三升豆アハキ煮散豆飲汁又方大豆三升以水一斗

煮取五升去滓カサ內桑根カサ白皮切一升煮取一升六合二服腫頓

消當利三行又方以水一斗研麻子三升取煮赤イシ小豆三

升豆熟散豆飲汁又云上氣喘息方桃人トウネ皮一升搗為

泥分以酒若湯服之

治短氣方第三

病源論云短氣者平人无寒熱短氣不足以息者體實也實則氣盛則氣逆不通故短氣也又肺虛則少氣不足之令短氣則其人氣微常如少氣不足以呼吸也

僧深方治短氣欲絕不足以息煩撓益氣心煩竹根湯方

竹根一斤ヤナヅナ麥門冬一斤ヤナヅナ甘草二兩オウゴン大棗十枚オウゴン粳米一升コメ小麦一升コメ

凡六物水一斗者五兩餘麥米五兩餘就煮之內藥煮取二升七合服八合日三

不能飲以綿滴口中ヒタテ醫門方治胸中痞塞短氣年久及痛也結曰脇者方穀脈意不申也

或腹急痛方 伏苓フツクワ四兩 甘草二兩 半夏三兩

醫心方卷二

生薑三兩杏人百顆水七升煮取二升半去滓久溫三服カフモツモネ

と相去八九里泄氣若氣不下加太黃檳榔人取利為佳分カフモツモネ

千金方治短氣不得語方炙子二十七枚豉七合水二升煮豉モツイフクキマシ

取一升半去豉內炙子煮取八合服半升又云卒瘕氣者方モツイフクキマシ

搗薤取汁服一升立愈又云冷氣短方枳五兩絹袋盛ツイコゴラ

酒一升漬三七日服之任性ツイコゴラ

治少氣方第四

病源論云少氣者此由藏氣不足故也肺主氣而通乎呼吸藏

氣不足呼吸微弱而少氣也胸痛少氣者水在藏府之故也

水者陰氣也陰氣在內故少氣也 廣濟方療腹冷氣不

能食及少氣調中丸方 人參カクニクニ五兩 茯苓フクラン五兩 甘草五兩

白朮五兩 干薑カンショ兩 枳實チジツ蜜和丸空腹溫酒服ヤリ如梧子

卅九日二夜一有益ツキハ盡更合不飲酒アタラシ煮大棗飲下不利忌

海藻セキソ桃米酢 千金方治之氣方 芍藥クコ二兩 生薑

二兩以水三升煮取一升頓服 葛氏方治卒之氣之不復

報肩息方ル干薑三升兼持之義吹咀應細切以酒一升漬之服一升日三

又方度手オホセ母拍シ析度ハフ心下灸ヤチ三壯即差 又方麻黃三兩

先以水五升煮一沸去沫モト乃內甘草二兩杏仁六十枚煮

單方

取二升半三服

治氣噎ルムル方第五

杜結反

病原論云氣噎由陰陽不和藏氣不理寒氣填於胸

臑故氣有阻塞不通而謂之氣噎ルムル令人喘悸胃背痛

也又云噎者一日氣噎二日憂噎三日食噎四日勞噎五日

思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦障絕津液不行ナカ

憂患嗔怒所生所生所以謂之五噎者噎塞不通也

新鋹方治氣噎胸塞不達方コトハ水脹ミツ塩末一大匙又方含

咽差酒取差心酢モ之得テ又方蘗蜜合ミツ令相得細ミ含咽

之又方鳩ツバメ巢取汁しん脹五合又方冬夏中它又方冬ヤリ第五

雅又灸ヤリ內踝上三寸

集驗方通氣壅湯方半夏八兩洗桂心三兩生薑八兩

凡三兩物以水八升煮取三升服半升日二

千金方治ハレ壅氣不通ハレ永不得食方杏仁三兩桂心三兩

二味丸如棗核稍咽之臨食先含弥佳様要方

治真狂方第六

病源論云夫真狂氣者腎之積氣也起於驚恐憂思トモ所止也

若驚恐則傷神心藏神也憂思則傷志腎藏志也神志傷

動氣積於腎而氣上下遊走如狂之責故去責其氣

乘心若心中踊如車所驚如人所恐五藏不定食飲輒臨

氣滿胸中狂癡不定妄言見此驚恐責其之狀也若氣

滿支心下煩亂不欲聞人聲休作有時乍罷乍覈吸短

氣手足厥逆內煩結痛溫欲臨此夏思責其之狀也

醫門方云論曰奔狂病者從少腹起上衝喉咽發作時欲

死皆從驚得之療奔狂氣方

生葛根クハミ甘李根クハミ白皮ハク切ハク二升水九升モ煮取三升ハク溫三服ハク

相去八九里ハク療奔狂氣在心胸中不下支滿者方ハク生薑

五兩オホクニ半夏洗四兩下桂心オホクニ人參カネ吳茱萸カネ甘草オホクニ伏苓下各二三兩

水七升オホクニ煮取二升半分溫三服之相去八九里オホクニ又云奔豚法

宜灸氣海丹由開元皆當其穴灸之穴在臍下一寸二分

是也隨年灸之小品方云師曰病有奔豚有吐膿有驚怖

有火灸耶此四部病皆從驚得之所言如奔豚之狀者是病

人氣如豚奔走氣息喘迫上逆之狀也湯方用贖猪者謂

雄崔氏食經作豚音徒昆又猪長不滿三尺者曰豚也雄猪斗子是先逐之使奔之然後斂取面及臍合藥也

葛根根本猪湯方葛根八兩干者生李根去皮一升人參三兩木

二兩半夏一升洗冬夕藥三兩當歸二兩桂五兩生薑一斤

要方心方卷二

甘草二兩 凡十物以花汁二斗煮得五斗溫服八合日三牝屬奪

牝湯方 牝屬三兩 桂肉八兩 李根一斤 甘草三兩 凡四物

煮牝令熟取汁一斗七升煮李根得七升汁內藥取三升

服五合日三夜再 廣洛方療賁氣在胸心迫滿支寄

方生薑一斤 半夏四兩 洗 桂心三兩 人參二兩 吳茱

萸一兩 甘草二兩 右以水一斗煮取三升絞去滓分溫三服

忌生菜麵粘食

粘女座及俗作粘

集驗方賁牝伏苓湯治虛氣五藏不足寒中厥逆腹

滿氣賁衝胃障發作事欲絕不識人氣力羸劣小腹起

騰踊ル如犛子走并ニ走リ下方下ニ生葛八兩生ニ甘李根白皮切切ニ生薑生ニ

五兩五ニ伏苓四兩伏ニ半夏ハナハナ一升一ニ人參人ニ三兩三ニ甘草甘ニ三兩三ニ當歸當ニ兩兩ニ

芎コ二兩二ニ肥コ一頭一ニ并并ニ者者ニ逐走逐ニ令口中沫出沫ニ取取ニ治治ニ

如食法如ニ以水足淹以水ニ肥肥ニとと煎煎ニ之之ニ澄取清汁澄取清汁ニ吹去上吹去上ニ肥得肥得ニ一

斗斗ニ二升二ニ酒酒ニ二升二ニ并并ニ血合血合ニ煮諸藥取五升煮諸藥取五升ニ服八合服八合ニ日三千金日三千金ニ方方ニ氣

治上下治上下ニ否塞否塞ニ不能休息不能休息ニ破破ニ氣氣ニ九方九方ニ桔梗桔梗ニ三三ニ胡胡ニ七七ニ

枳枳ニ十十ニ橘皮橘皮ニ三三ニ干薑干薑ニ三三ニ枳枳ニ六六ニ烏頭烏頭ニ七七ニ

人參人參ニ五五ニ桂心桂心ニ四四ニ厚朴厚朴ニ三三ニ枳殼枳殼ニ三三ニ附子附子ニ五五ニ

甘草甘草ニ八八ニ細辛細辛ニ三三ニ亭歷亭歷ニ四四ニ大黃大黃ニ八八ニ檳榔檳榔ニ八八ニ

三

一

伏苓フツホト四分

前胡マコト四分

木ヨネヲ六分

防葵ヤナヒヒ四分

芎藭オムナカヲシタ四分

當歸ヤトセリ七分

吳茱萸カフシカア六分

甘味丸ハカリ如梧子

圓又作圓腹十九日

二有アラム

熱者モウハ空腹オホセリ脹之

又云治氣上不得卧神秘方

橘皮

生薑

紫イヌエ蘘エ

人參カウニナクヤ

五味子シムカク

五味各等分シ五兩水七升

猪高及腹滿也

半モ煮取三升分三服

又云治氣滿腹脹

下氣湯方ホツクヤ半夏升

生薑一升

人參カウニナクヤ一兩半

橘皮三兩

四味切之以水七升

煮取三升分三服一日令盡

治淡飲方第七ウ淡ウ陰

病源論云淡飲者由氣脈閉塞津液不通水飲氣停

在胸府結而成淡又其人素盛今瘦水走腹間漣浦婦及有

漣及水

聲謂之淡飲其為病也胸脇脹滿水穀不消結在兩

脅得及脅骨也

肋水入腸胃動作有聲身體重多唾短氣好眠胸

背痛甚則上氣欬逆倚息短氣不得卧其形如腫是也

南海傳云若覺淡飲闕胃口中垂數臯流清水糲

糲糲

取孟和酌之

糧糲糲開戶滿槍糲准語聲不轉飲食已味動歷一句如此之

也上徒感及下米和羹亦作糲也

流飽食便差イエス不勞灸項無假イワカス援イワカス回斯乃不泔湯藥

厄陳糲羹不糲

而能蠲疾即醫明之大規矣氣不得卧其形如腫

是也

千金方云夫飲有四其人素盛モト今瘦ヤス水走腸間力の及瀝也瀉瀝瀝水下

有聲謂之淡飲下後水流在脇下欬唾引痛謂

之懸飲水行歸於四肢アセエ當汗出而不汗出ルシ身體重重謂

之溢飲其人欬倚息短氣不得卧其形如腫謂之支飲

淡飲者當以藥濕和之懸飲者干棗湯主之甘草四兩

大棗廿枚干薑二兩三味水斗煮取二升分三服降飲

者青龍湯主之麻黃六兩カハネシ桂三兩甘草二兩灸

石膏二兩一名細石杏仁廿枚カラモウシ大棗十枚オホナツメ生薑二兩凡七物以水九升

煮麻黃減二升乃內餘藥得二升去滓七升服一升溫覆令汗オホシ

く出多者温粉之汗上勿復服

支飲者本防已湯主之カスハウニメシ本防已三兩石膏鷄子大十二枚アヲカニラ

桂心二兩人參四兩カクニケケ四味水六升煮取二升分再服又云

伏苓湯主胸臈淡滿方ルル伏苓四兩半夏二兩生薑二升

桂心八兩四味水六升煮取二升半分四服又云治卒

頭痛如破中痰厥氣上衝所致名為厥頭痛吐之即差方單煮茗作非冷又非中惡其病是胸臈飲二三升

許適冷トシ暖飲二升須臾ホル盡吐スレ畢又飲如此數過劉

者須吐膽乃心不損人又云灸臈飲冷振也堆載又辟法灸通

谷穴五斗壯在幽門下一寸幽門在巨闕旁半寸錄驗方

治胸葦淡飲食散經日併吐シカレキカラ出方單服生薑汁一升

欲吐ハナシ之不吐ハカシ自向ハカシ下出去タセト葛氏方治胸中多淡頭

痛不欲食及飲酒人瘵ハナ僻道淡方ハナ恒山ハナ二兩甘草ハナ

一兩松蘿十兩ニカウリヲホフ蒺藜三七枚以酒水各一升半煮

取升半初服七合取吐ハナシ不盡餘更分二服後可服半

夏湯又方先作一升湯投一升水名為生就湯乃食

三合塩以此易送須臾欲吐ハナシ便擣出未盡更服二合

又云若胸中常有淡冷水飲虛羸不足取吐者方汪

伏苓湯方号半復半復一升洗生薑半斤伏苓三兩水七升煮取

一升半分再服 小品方茱萸湯治胸中積冷心下淡水煩

滿汗不下飲食心胸應背欲痛方 生薑三兩 半夏三兩

烏先久水深廣良也

カクハカク

桂心三兩 吳茱萸三兩 人參一兩 大棗廿枚 甘草一兩

灸アフル

凡七物以水九升煮取三升內白蜜五合分三服 今案集驗

蜜白如聚甘美

方生薑五兩 胡洽方治痰冷癖氣 方生薑八兩附子四兩

葛氏方

二物以水三升煮取一升半分再服 僧深方治五飲酒癖方

同之

朮一斤桂半斤 干薑半斤三物治下節和蜜丸如梧子服

十九不稍增初服當取下先食服日再 集驗方治胸中淡

飲腹中水鳴食不消臨吐水湯方大檳榔廿口 半夏

胃心分良乙

ト二

八兩洗アスヘ生薑四兩カウモシセネ杏仁四兩トキト白朮四兩トキト茯苓五兩ハキレ橘皮三兩ハキレ切水一

斗モテ煮取三升分三服効驗方甘草丸治面飲方甘草二灸灸アス

葳蕤一分ホカウツホソ二物治下節フルヒ蜜丸ハカリシ如梧子ウタモ欲下病服三九日ヌケ三

丸不下セ憎之以吐為度又云斯葶散治淡百病常

用ル驗方シルシアル七月七日葳蕤二枚ホカウツホソ赤小豆二兩アカアヅキ黍人二兩ウツホソ凡三物

治合下節ヤダウ以溫湯和服方寸匕今案新録方依當吐病愈丁一有赤小豆一五

人參一五又云斯葶丸治骨蒸ヤダウ間有澹水方蜀附子ヤダウ一分楊音カキ又梨蘆

一ト炙イシ甘草一ト炙イシ赤小豆一トアカアヅキ底下一トヤダウ凡五物治合下節ヤダウ蜜丸ヤダウ

如小豆セシ一服五丸セシ當吐青黃汁イヒ不知稍增セ范汪方病支飲不得ル

支飲謂飲水過多停積

枕臂亭
之問文
余扶杖故云
文飲其
病令人咳
逆喘食身
體如腫之
狀謂之
支飲

息亭歷太素寫肺湯主之方今タチマニヤシ亭歷自九紫包治余オキム太素

枚以水二升煮棗令得一升半去棗內藥ハナサリ丸ハナサリ如彈丸二或本得

一升盡服之セリ極要方療淡氣方橘皮二兩右以水三升二或本

煮取一升二合為一服（アタ）間日服之（マカ）新録方治淡飲方苦瓠蘢ホカヒナク

赤小豆（アカアヅキ）小檗（コハカ）蜜丸飲服如小豆三九（ハカリ）大佳又方瓜丁

赤小豆各一兩（ハナサリ）小檗蜜丸飲服如小豆（ハカリ）七丸（ハナサリ）淡菴（ハナサリ）

治癖食方（ハナサリ）第八（ハナサリ）

病原論云夫五歲調和則禁衛氣重（ハナサリ）禁衛氣重則（ハナサリ）

津液通流（ハナサリ）雅復多飲水漿不能為病（ハナサリ）攝養市方三

雖_レ否_レ澤立雖_レ不_レ澤則腸胃不能宣行因飲水漿便令
停滯不能行更遇寒氣即聚而成癖_{ト云ハ}者謂_{イフ}癖側在於
兩脇之間有時而痛是也通_云玄絃癖之疾不專於一
病者肝之所生癖病者脾之所成絃生於左癖成於右_ル絃者
如弓之絃肝之所生肝与膽為清淨之府不受外邪故知同
生病也癖者脾胃為水穀之海食不消偏癖一邊故名
為癖令一_ハ絃癖同為一疾實難矣_ホ

龍門方治絃癖病腹堅如石方

取苦瓠_{ホカヒモノ}開口盛大_{イシ}嚴醋_{トク}滿中密塞口釜中煮令

極熱出^し瓠^ホ以^テ熨^{ノセ}腎^{キン}囊^ニ冷^ヒ即更煮^ク時即作葱豉^{是義又}

湯食之每熨時皆以衣襯身^{ウチニヤシ}

^{一名唐豆}
^{下州カニキ}
桔梗^{キキョウ}

極要方治癰^レ疔^レ方 鱗^{カハカメ}甲^多六^ト白^多木^ト六^ト枳^多殼^ト六^ト生薑^{クハクハ}

^{一名青衣}
一^ト夕^ト月^ト衣^ト

^{カニキ}
一^ト夕^ト月^ト衣^ト

八^ト分^ト大^ト黃^ト十^ト分^ト前^{ウセ}胡^ウ四^セ分^ト右以水六升煮取一升六分溫

^{ウセ}
^{ウセ}

三^ト服^ト忌^{イム}猪^{イム}巢^{イム} 千金方治心^ニ上^ニ淡^ニ蔭^ニ僻^ニ氣^ニ吞^ニ酸^ニ

半^ト復^ト湯^ト方 半^{ホソクニ}夏^{ホソクニ}三^ト兩^ト生薑^{クハクハ}六^ト兩^ト附^ニ子^ニ一^ト枚^ト吳^{カラハ}茱^ハ萸^ハ萸^ハ萸^ハ

三^ト兩^ト四^ト味^ト水^ト五^ト升^ト煮^ト取^ト二^ト升^ト半^ト分^ト三^ト服^ト

葛^ト氏^ト方^ト治^ト腹^ト中^ト冷^ト澀^ト水^ト穀^ト癰^ト結^ト心^ト下^ト停^ト淡^ト雨^ト脇^ト痞^ト滿^ト

^{平凡久痛也}

葉^ト之^ト烏^ト轉^ト逆^ト宮^ト飲^ト食^ト方^ト大^ト黃^ト三^ト兩^ト甘^ト草^ト二^ト兩^ト蜜^ト一^ト升^ト二^ト合^ト

是義又

ト乙

棗廿七枚以水三升煮棗取开内諸藥煮取一升七合分

再服又方伏苓一兩茱萸三兩カクハシカニ 檮密丸如梧子服五九三

醫門方療疝氣冷痛吐酸水或目出熱契水得ル

此病方木乾薑各二兩橘皮シネラクハシカア 細辛アララネクセ 吳茱萸各一兩伏苓トホト

人參各二兩半右檮密カクハシカニ 蜜和為丸ミチ 空腹煖水下十九丸加至モセ

廿九日二トセ

廣利方理癖凡ル 腹痛雨助脇脹滿食少方紫胡カ得及 六分並ニ

桔梗八分通草八分伏苓六分トホト 赤芍藥エヒハクハシ 四下ハヤカサ 栝李人ウヘナ 四下研ク

鼈甲カハシラコフ 四分炙 切以水二大升煎取九合食後分温三服ヤ 如人行七カカリ

一名青衣

切又作亮

似蘭而

圓可作席

巴豆三枚

杏仁七枚 大黃如雞子大

大棗 節蜜丸 空腹以飲服如

硬五更反 堅一丈 作觀

陶景注云巴豆出巴郡

似大豆

一名巴麻

梧七九日一服

治胃及吐食方第九

モウハルル

病源論云胃及者ト云ハ營衛俱虛其血氣不足停水積飲在胃

管則七上藏冷而脾不磨ミニ不磨則宿穀不化其氣逆而成胃及也十九ナリ

則朝暮食吐暮食朝吐心下窄大如杯カヲリテ往往ト云寒熱チ甚者食

已即吐也シハリテ

醫門方云食已吐其食者胃中虛冷所致

胃中虚冷

効驗方干薑治丸胃及大吐逆胸痛羸瘦不得食飲温中

下氣使人進食方 吳茱萸二兩 小麦三ニ二兩 杏仁二兩

去皮七ノ干薑二兩 好豉二兩 蜀椒二兩 凡六物搗下篩

和蜜丸如梧子服七九日三 葛氏方治胃及不受食々畢

輒吐出方 大黃四兩 甘草二兩 水三升煮取一升半分再服之

本草注云 陳者謂僧深方治胃及吐逆不安穀枳子湯方 陳枳子一枚 姜豉二升

三年九年者之 茱萸五合末 三物枳茱萸合治為散以水二升半煮豉三

四沸減去滓汁著銅器中乃內散如鷄子攪合和合頓服之

羸人再服 經心方伏苓湯治胃及而渴方 伏苓四兩 澤瀉

四兩桂心二兩半夏四兩甘草二兩五味以水一斗斗、坎ヲ勘本書煮取二升半服ス

八合日三又云治胃及食輒吐方粟米令極白斗、坎ヲ勘本書搗篩下作丸

楮子大熟土ロク煮稍吞得ツメ下便愈徒重斗、坎ヲ勘本書及春心治方汪治胃及不受食カフニテクモ已欬ホソクア吐

四物常歸湯方蜜白如薤蕪甘美白蜜一升オホキセツヤシ當歸二兩オホセリ人參二兩半夏一升ホソクア凡

四物咬咀以水二斗合蜜アクル揚百升オホセリ過內藥銅器中ヤリ煎得六升ホソクア

再服トヲ加至一時復服セ盡又云橘皮湯治嘔吐及逆食飲不下方ニ

人參一兩橘皮二兩白朮一兩冬生薑三兩甘草二兩アセ凡五物切

以水一斗煎取三升トキ先食服一升日三

千金方治大虛胃及食下カフニテクモ唯便吐方人參一兩クニ澤瀉二兩オホセリ

胃心分長し

二二

甘草二兩

伏苓フナ四兩 橘皮三兩 桂心三兩 干薑三兩 青竹茹アヲツカハ五兩 大黃オホキ

六分 九味水八升 煮取三升 服七合 日三夜一 已利者去者キナウ

大黃 又方 蘆根アシノネ茅根チノネ以水四升 煮取二升 頓服下得

食今案新録方切各一升水六升 治胃勢逆下食者

又云 灸胃及食吐方

灸兩乳下各一寸以差為度 又方 灸脊上一寸廿

壯 又方 灸胃管穴十壯 在鳩尾ウヅノビ脊中央 極要方 療吐不

得食并胃反欲逆食即吐方 甘草一兩 橘皮一兩 生薑シロネ

八兩 葱白キノネ干四枚 右以水六升 煮取二升 半升三服 不心

更作

今案廣濟方葱白十莖 橘皮八分 甘草八分 生薑十兩 水八升

醫門方 療胃反不受食

訖臨吐方九半夏人參生薑各三橘皮二兩大棗十二枚白

蜜五合以東流水七升煮取二升半去滓內蜜更洋三升下

煎三五沸久溫三服相去八九里救急單驗方療及胃力

鳩生葛根絞汁二升服驗今案新錄方取六七合日二三服治胃熱逆不下食者

又云方灸兩乳下三寸扁鵲云隨年壯華他云壯神驗

治宿食不消方第十

病源論云宿食不消者由五藏氣虛弱寒氣在於脾胃之

間故使穀不化也舊穀未消新穀又入脾氣既弱故不能磨之

則經宿而不消也令人腹氣急噎氣酸鼻時腹煎寒

胃心方卷乙

壯熱是也或頭痛如癰之狀集驗方治凡所食不消方

取其餘類燒作末モ服方寸匕便吐去宿食即差イナ陸光録

說有人食桃有不消作病時已晚無桃就樹間得燒桃子王曰若久燐也也

燒服之登吐ルハナ出病即差小方同之南海傳云若疑腹有宿食

又刺膺胃宜須忍飲就湯指剔セシモ喉中痰吐令盡ヤ

更飲更決ユクリ以盡ル為度或飲冷水理ル无傷或干薑

湯斯甚妙也其日必須斷食明朝方始進食

范汪方治腹痛消穀トナル心利服大豆方

取大豆トク苧シ梘キ皂サ兒コ好者服一合分リ兩日四五服一日中四五合飯後

九ナハチ

輒服イタ難非飯後イタ可授間服趣盡フセ四五合飲服時手按豆

令烟シメツ光明アキラ若苦ナク堅難ナカ小減豆コトキ

范汪方治食生冷ヒヤヤチ之物或寒時衣薄當風食不消或夜食以

卧不消化心腹煩痛ウ脹急或連日不化方燒地令熱アヒカラ以蔣席ムシロ

布上卧シキウ上厚覆取汗愈又葛氏方同之新鋹方治宿食不消方薤白オホアヲネ

切一升致クキ一升水モチ四升煮取二升分二服又方主薑五兩カヌヲチ鵠取汁温

服之又方鵠ヱイル蒜ヒル如泥モ酒服ヤヒ如棗日三又方麴末干薑末一升酒

服一方寸匕日二又方灸大倉穴二百壯又方灸膺左右相去

三寸名魂舍テ並依年壯ヌシ准多益佳ナリ又方灸第五椎并左

漢方書

二二三

八五一

右相去一寸五分

錄驗方治宿食不消大便難練中丸方大黃オホホ六分ハツワカナ亭膠ハセリシヤ

四兩オホシカラモウセネ 葵イシ 杏人イシカラモウセネ 四兩オホシカラモウセネ 芒消オホシカラモウセネ 四兩オホシカラモウセネ 凡四物下節蜜和食已オホシカラモウセネ 服ハセリシヤ

梧子七九日三不知イシエ 稍增一名石肺又石脾

千金方消食丸主數年不能食方オホシカラモウセネ 麥蔞オホシカラモウセネ 一升ハシカラ 薑ハシカラ 四兩

烏梅オホシカラ 四兩七月七月カクナ 麴オホシカラ 一升オホシカラ 四味蜜和オホシカラ 服十九日オホシカラ 再至オホシカラ 九寒

在胸中及胃オホシカラ 蓄心者オホシカラ 皆老 槎要方治宿食不消

心腹妨滿脹痛オホシカラ 須利方訶梨勒皮八オホシカラ 十オホシカラ 桔梗オホシカラ 六オホシカラ 檳榔オホシカラ 今

夕藥オホシカラ 大黃オホシカラ 十分右為散空腹煮生薑飲服三錢オホシカラ 上日

二服

葛氏方治脾胃氣弱穀不得下遂成不復受食方

大麻子人一名芥一升大豆黃卷二升并熬令黃香搗篩飲服

一二方寸日四五今葉僧保方大調中下氣調冷熱利水穀

治寒冷不食方第十一

千金方消食斷下丸寒冷者常將之方 麴末一升大麥

蘽末一升 吳茱萸四兩三味蜜和服十五丸如梧子日三

又云消食丸主數年不能食方 小麦蘽一升

干薑四兩 烏梅四兩 麴一升 四味蜜和服十九

日再至卅丸寒在胃中及胃反番心者皆差

范汪方治久寒不欲飲食數十歲方萊萸八合生薑一斤切キ

消石一斤凡三物清酒一斗水五合煮令得四斗絞去滓力ル

溫飲二斗病即下去勿復服也葛氏方治胃中虛冷不能

飲食輒不消羸瘦中カラク懈乏四支狂言百疾目此牙生方薤白二

斤枳實三兩カラシ橘皮一兩大棗十二枚粳米二合豉七合以水

七斗先居今又煎得五斗內諸藥煮取二斗分三服日作之カフニクセ

廣濟方療冷熱不能食及少氣調中丸方人參五兩伏

苓五兩甘草五兩白朮五兩乾薑四兩クハハトカア梔以蜜和丸空

白木澤クハ厚朴ホク黃耆ワウ丹府トリ高本ア紫菀ソ甘草カン人參ニン黃芩ワウ麥冬マク及

各二ナニ生薑シヤウ三兩サン橘皮キヒ一兩イチ右十味ミツ切キ以水ミヅ一斗イツ煮取ニク

三升サン去滓セ分三服フ又云目飲酒上熱下冷不能食方人參カン

甘草カン二升ニ升麻シヤ二兩ニ干藍カン二兩ニ粟米ア一合イチ凡五味ミ切キ以水ミヅ六升ロク

煮取ニク米コメ去滓セ分三服フ又方平且空腹ヘ服真酪マ一合イチ即愈キ

又方常食ヘ粟ア食イ及粟粥カ之又云治虛上熱下冷氣上頭痛フ

痛フ胃煩イ人參湯カン方人參カン二兩ニ茯苓フ三兩サン麥門冬マ二兩ニ

粟コメ二兩ニ凡四物水ミ七升シ煮取ニク四升シ分三服フ日三夜二ニ

又云治內虛上熱ア下冷氣ヒ不下頭痛フ胸煩フ頭眩フ是義又

湯方 豉一升水二升一方三升令小沸内豉令三沸頃

積聚由陰陽不和府藏虛弱受邪積聚食不消寒在胸中或及胃宮食積瘦方 積聚由陰陽不和府藏虛弱受邪積聚食不消寒在胸中或及胃宮食積瘦方

飲積聚食不消寒在胸中或及胃宮食積瘦方 茱萸

二兩枳一兩半黃芩一兩前胡一兩 細辛六分白英二枚人參

三分 茯苓一兩半附子一兩 干薑六分半夏一兩 凡十一物

下篩九以蜜服如梧子三九日三不知稍增之 廣濟方療臍上

熱臍下冷日西身體熱疼輕食不下夜卧不安方苦茶

六分 龍膽五分 夕藥四分 黃連六分 枳殼四分

青蘘子五分 大黃二分 黃芩四分 枳殼二分 芒消二分

藥方

轉篩蜜丸每食後以飲服丸如梧子十四丸日二

治穀勞歌卧方第十三

病源論云穀勞者脾胃虛弱不能傳消穀食使府藏氣
否眠是也葛氏方治飽食竟便卧得教勞病令愈
支塞也其狀令人食已則卧支體煩重而嗜眠是也

葛氏方治飽食竟便卧得教勞病令人支煩重

歌卧食畢輒甚方大麥蘩一斤トシヤシ枳一兩干薑三兩枳末

服方寸匕日三四服今案范汪方大麥蘩一斤
枳二升干薑三兩也又云治食過飽煩

但歌卧而腹脹方ホシ
ハツラ
フクム欬麥麵令微香枳服方寸匕得麥大

麵益佳無麵者孽可用

新録方治穀勞食竟即目而睡方 以酢二升煎杏仁

カラモウ七ネ

五十枚取一升服之覆取汗 又方食傷飽為病胃

脹心滿者方 芎藭管七枚 又方十沸湯半水共三

升飲之當吐食出

治惡方第十四

病疸論云惡心者心下有停水積飲所為則心裏澹然

徒監徒敢ニ又

欲吐為惡心

水柱也謂水中
水柱動也

千金方治惡心方 苦瓠蘂并一升切漬水三升煮取一升

ニカキウネヲ

七ネ

胃心方

二二二

頤服頤更吐并下如^{オホハ}瓊衣^{一々草前草}三升葛氏方治人忽惡心不^{コソレシキ}

已方^ヤ薤白半斤柴萸一兩豉半升米一合棗四枚枳實二枚<sup>オホアラフネ
タルモ弱遊方麻</sup>

塩如^{カリ}彈丸水三升煮取一升半分三服又方但多爵<sup>カア
カウミカウミ</sup>荳蔻^{上音豆下呼倭友}

子及取^{タラフ}檳榔亦佳孟詵食經惡心方取懷香華葉^{クハオモ}

煮^{ヤチ}服之新録方治惡心方生薑^{實即二三音}合皮^{オカウ}鴉服^ウ五大兩汁

又方檳榔人未^{ルカ}寸匕生薑汁^{ムサチ}服之日二又加橘皮更佳^{オモ}

槎要方療^{ハラフクシ}於淡氣在胸腹脹不能食吐水沫^{ヤホ}耿^{コソレシキ}惡心方^{オモ}

吳茱萸^{カヲハシカア}開橘皮二兩杏人^{カヲモノシヘ}三兩生薑汁^{クハハシカア}三合右以水五升^{十日辛久不安也}

煮取一升六合去滓<sup>セナ
カハシ</sup>內檳榔人散方寸匕^モ分再服得一兩行

利大快イロヨシ三五日サツ服ツク一劑病都除ナ乃傳トメテ亦可ホカニハキ加厚朴イロヨシ三兩トク蒼

治噫ホカニハキ酢方イロヨシ第十五トク

病トク臣論云噫トク酢者由上トク雖有停痰脾胃有宿冷故不能

消穀イロヨシ不消則脹滿而氣逆イロヨシ所以好噫而吞酸イロヨシ氣息酸イロヨシ

臭イロヨシ葛氏方人食畢噫酢及酢心方人參二兩イロヨシ茱萸半

升イロヨシ生薑三兩イロヨシ大棗十二枚イロヨシ水六升イロヨシ煮取二升イロヨシ分再服イロヨシ同イロヨシ

千金方治食後吐酢水方イロヨシ干薑二兩イロヨシ食茱萸半升イロヨシ二味

酒服方寸匕イロヨシ日二立イロヨシ驗イロヨシ醫門方療食噫或酢咽方イロヨシ萸二兩

人參二兩イロヨシ吳茱萸二兩イロヨシ生薑三兩イロヨシ大棗十二枚イロヨシ橘皮二兩半イロヨシ切以

水六升煮取二升去滓七分溫二服又云療食後吐酢水食薑

飯粥並作方オエル厚朴ホクシキ吳茱萸カスミカタ桂心カスミカタ橘皮各二白朮各二二兩

右搗篩ミ為散ミ空腹服方寸匕モ甚効

廣濟方療吐酸水每食即變作酸水吐出方

檳榔カフニク人十二カフニク分人參カフニク六分カフニク茯苓フク八分フク橘皮カフニク六分カフニク畢拔カフニク

六分カフニク搗篩為散平晨空腹取生薑カフニク五大兩カフニク合皮カフニク搗絞カフニク

取汁溫內散方寸匕モ欖カシ調頻服之日一服漸加至一匕

半カシ若利多賦カシ以カシ炭カシ淺カシ為度カシ忌生カシ油カシ膩カシ猪カシ糞カシ臭カシ

効驗方治食後吐酢水洗カシ如酢漿カシ食薑即割カシ為胃カシ冷カシ

干薑散方オホシタ 柴萆一兩 干薑一兩 朮一兩 甘草一兩 凡四

物治下節用酒若湯服方寸匕日三

治臨吐カクシ方第十六

病洎論云臨吐者皆由脾胃虛弱受於風邪所為也若風

邪在胃則臨カクシ辜間有停飲胃內有久寒則臨カクシ而吐其

狀長太息心裏澹然或煩滿而大便難或溏泄思列習異逆ニ及並其作故

養生方云八月勿食被霜菰カウケル向冬發オホトシ熱及溫病食飲寒或

心停飲不消或為及胃槎要方療臨吐此病有兩種一者積

熱在胃臨逆不下食二者積冷在胃臨逆不下食若是積

熱在胃臨遲宜依合生薑根等五味飲服之生薑根切一升

生麥門冬一升青竹茹一升生薑切五合伏苓五兩石切以

水八升煮取二升半去滓加竹瀝六合攪調分三服

博洛安衆方治臨遲不食方厚朴三兩去皮薑炙人參

一兩橘皮一兩炒右水三升煎取一升分作三服飯後服

僧深方生薑湯治食已吐逆方生薑五兩伏苓四兩

半ホソクミ反一升橘皮一兩甘草二兩五種水九升煮取三升合

分三服廣洛方一療脾胃中冷熱每食即臨吐方

人參二兩甘草一兩半炙橘皮一兩半炙橘皮一兩半炙

葱白三兩 生薑三兩 切以水七升煮取二升三合絞去滓分

溫三服忘生冷油膩猪鼻海藻 范汪方半夏湯治胃中之

氣而飲欲死方人參二兩 伏苓二兩 生薑三兩 白蜜五合

半復三升 洗アヲハ 凡五物以蜜肉六升水中燒之百過以餘藥合

投中煮得三升分四服禁冷食治干飲之用此 醫門方治

臨逆變吐食飲不下方橘皮二兩 木二兩 生薑三兩

人參二兩 甘草二兩 右切以水七升煮取二升半溫三服相

去八九里止飲橘皮湯方橘皮二兩 干薑二兩 人參二兩半

以水六升煮得二升服七合日三 新錄方治臨吐不下食方

醫心方卷之

卷九

新根切一升

生薑合皮切一升

九水四升半煮取二升二服

三

錄驗方治熱區方蘆根茅根切各一升以水六升煮取二升

分三服

葛氏方治卒臨宛

又厥逆方

生薑斤切棗

四兩水七升煮取三升適寒溫服一升日三升方云諸飲

減心下

緊痞臍間有水淡眩悸者

小半復湯主之

半復

一升生薑八兩伏苓三兩三味水七升煮取二升半二服又云凡

飲者多食生薑此是飲家聖藥也又云飲飲方生薑

湯二升頓服即吐又云飲飲法灸心俞百壯又方灸

臍俞百壯又方灸胃堂百壯又方原關五十壯又方灸

胃管百壯三報又方灸脾募百壯三報

治干嘔方第十七

病源論云干嘔者胃氣逆故也但嘔而欲吐而無所出

故謂之干嘔 僧深方治胃逆乾嘔欲吐無所去人參湯方

人參二兩干薑二兩薑四兩澤瀉二兩桂心二兩甘草二兩

一種落款可尋

伏苓四兩大黃一兩八物以水八升煮取三升服八合日三

又云茱萸湯治干嘔吐逆煩心頭痛方茱萸半升

大棗十枚人參三兩生薑六兩凡四物以水六升煮取三升

五合日三服又方茱萸一升大棗十二枚以水七升煮取三升半分

三服又方半夏干薑各等為散服方寸匕又方生薑

汁五合蜜四合二物先煎蜜減一合竟投薑汁復煎

數沸稍^{クハ}啖^{クハ}之勿^シ久^シ則口強不可啖

范汪方治卒^干欲^{本元}煩悶方用甘蔗搗之取汁溫服一升旦

集驗方^治干飲或歲手足^{オクシ}逆冷方^{オクシ}橘皮四兩生薑

六兩切以水六升煮取三升服一升^{オクシ}葛氏方治干臨

不息方^{オクシ}鵝葛根絞汁服一升許又方灸兩手腕後兩筋

中一夫名^{オクシ}間使各七壯^{針灸經間使二穴在掌後三寸內兩筋間}焉^{焉腕及掌後節也}

孫思邈曰^{夫者以四指}寫一手夫^{以肌肉文}又千金方治干飲^{オクシ}歲^{オクシ}厥方飲新汲水三升又方煮豉

理薤解^{オクシ}又千金方治干飲

三升飲汁又方濃煮三斤蘆根飲汁又方空腹飲

生薑汁又云炙干薑方
冬心主尺澤亦佳今葉明雲云

又方炙乳下一寸廿壯

治歲方第十八

北越方

病源論云歲者脾胃俱虛受於風耶故令新穀入

胃不能傳化故穀之氣與新舊相干胃氣則逆

胃脹氣逆目遇冷析之歲也

猪黃方

葛氏方治卒宛不止方飲新汲井水數升今葉新

經方云

水二升又方但閉氣析之又方痛爪眉中央用氣

又方好豉二升煮取汁飲之又方枇杷葉一斤水一斗

煮取三升再服又方煮蘆根之佳今葉千金方濃煮三升飲汁

又方以物刺鼻中若以少許皂莢內鼻中令嚏即嚏カハラチキイ

錄驗方治欬噎橘湯方生薑罌橘皮二兩甘草兩凡三物文下

以水六升煮取二升一服七合日三新錄方治宛方セヨ

單脹十沸湯任多少又方生薑五大兩合皮搗取汁服

又方荻根切二升水四升煮取一升五合稍咽之アシネノ

又方橘皮五兩以水三升煮取一升二三服又方桑椹セヨ

下一寸又灸胃管穴ルルセクリ服セラ 蘇敬本草注治宛方千歲アヒラ

薑汁崔禹錫食經署頰為粉和薑汁作粥食之小ヤナツラ煮

一名山羊

品方治宛方灸腋下蕞毛中五十壯又方灸石廕
穴五十壯千金方治宛方灸^{セラ}策^{ヤクモ}一漿^{カリヌ}炷如麦七壯
又方灸脊下四寸七壯又方灸鼓三升飲汁
又方空腹飲^{ツタ}姜汁^{ハシカ}一升

醫心方卷第九

光康

醫心方卷第九背記

病源論云夫飲酒人大渴而飲水与酒停聚胃中之上
蘊積不散而成癖也則令嘔吐宿水色如胆汁小豆汁之類酸
苦者故謂之酒癖類痰也

以上第十六葉

楮

陸法言云刃吕反釋氏云穀樹也惡木也
昂鳥危之山多雜檀生孫愐云木名
似穀子可以爲藥也又名通天木葵
倫取爲紙孫伯玉或作柠

以上第廿一葉

醫心方卷第九札記

一頁下
八行 引於膊背此以下仁和寺本見存 二頁下 如涎出瀆

沫下千金作刻而涎 五頁上 苗詭說訛 下一汗

者下汗字衍外臺卷十刻 行 咳味草體 七頁上

寸列外臺引古今錄驗文異義同 欲烟外臺欲作欲下二欲 行 三千

食方仁和寺本 下一 又方橫度千金方文異義同蓋

推据其連前文怨六謂正 十八頁上 喘食息訛 下六

當乳脊呂兩傍如度也 三行 標託 索于蓋幹之略

乏海之訛乏仁和寺 廿一頁 惹白干謂惹白莖也

廿三頁 烟仁和寺本同 廿四頁 又云消食丸仁

寺本無此方案此三行以別紙補足殆自亦六頁咀
後增之此方又為前條所載則無者似是下六行咀

咀字加筆似嘿亦九頁生薑根等生薑根切仁和寺本

二薑字共作世二頁又方橘皮仁和寺本
盧宜後改下七行此以下缺

醫心方卷第十

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治積聚方第一

治諸疝方第二

治七疝方第三

治寒疝方第四

治八瘡方第五

治癰瘻方第六

治暴癰方第七

治蛇瘻方第八

治蠱蠱瘻方第九

治臭瘻方第十

治穴瘻方第十一

治長瘻方第十二

治米癰方第十三

治水瘻方第十四

治食癰方第十五

治疽瘻方第十六

水病證候第十七

治大腹水腫方第十八

治通身水腫方第十九

治水腫方第二十

治風水腫方第二十一

治水癖方第廿二

治身面平方腫第廿三治犯土腫方第廿四

治黃疸方第廿五

治黃汗方第廿六治穀疸方第廿七

治酒疸方第廿八

治女勞疸方第廿九治黑疸方第卅

治積聚方第一

病源論云積聚者由陰陽不和府藏虛弱受於風
耶搏於府藏之氣所為也府者陽也藏者陰也陽
浮而動陰沉而伏積者陰氣五藏所生始發不離
其部故上下有窮也聚者陽氣六府所成故無
根本上下無所留心其痛無有常處肝之積名曰肥

氣在左脇下如覆杯有頭足令人發瘡瘡心之積名曰伏

梁起脊上如臂上至心下脾之積名曰痞氣在胃管覆

大如盤令人四肢不收黃疸飲食不為肌膚肺之

積名曰息責在右脇下覆大如杯令人洒淅寒熱腎

之積名曰贗牝發於少腹上至心下若牝責之狀上無

時令人喘逆骨萎少氣慳門方玄辨曰肥氣者肥盛

也言肥氣如覆杯突出如肥盛之狀伏梁者言其大如臂

狀似屋舍梁棟也故名伏梁痞者滿也言其氣滿痞結

成積也息者長也奔者羣也言其氣漸長而逼於

羣故曰息奔病似伏脉而上衝心者也又有奔脉之氣非
積病也名同而病異焉華他方云貳車丸常在尊者
後一車故名二車丸主心腹衆病羣上積聚寒熱食飲
不消或從憂患喜怒或從勞倦氣結或有故疾氣
浮有上飲食衰少不生肌宐若辟在脇吞吞一九
即消若驚恐不安吞一九日三獨卧不恐病劇晝
日六七夜三吞微者晝日四五夜再吞寒辟隨利
去令人善失氣失又治女子絕產少腹苦痛得陽七
氣痛引胸中積寒所致風入子道或月經未

絶而合陰陽或急欲溺而合陰陽或衣未襮而合陰陽或急便著之濕從下上久作長病吞藥如上百日有子貳車丸方

蜀樹成樺フモヘカミ一斤

乾薑クシハハカア大小相稱廿枚粳米ウヅメ一升

朗陵烏頭カチルルトツロウチ大小相稱廿枚鋹イシ竈中灰一升

凡五物以水一斗半漬灰練囊中盛半絞結

內灰中一宿暴乾之皆末諸藥下篩ヒルメ和以蜜唾

吞ハカリ如梧子ニ丸勿用漿水也身中當痺ヒルメ藥

力盡乃食老小裁之

范汪方五通丸主積聚單飲宿食寒熱煩結長肥
膚補不足方

枳目一兩

洗

附子一兩

洗

厚朴一兩

一名消石

杏人子三兩

熬

半夏一兩

洗

亭歷三兩

熬

芒消五兩

一名消石

大黃九兩

熬

凡八物別擣亭歷杏人使就令和諸藥末

使調和以齏擣五千杵吞如梧子二丸

又玄三合丸主五藏寒熱積聚臌脹腹大空鳴而噫食不生肌膚劇者效逆若傷寒病已愈新令不發飯已吞五丸飲多吞十九取大便秘利長安益氣補不足可常

服方

大黃二兩

一方二兩推碎
整令變色

亭歷一升

整令變色

附子一兩

煨令
乾

杏人一升

整令變色

消石一升 苣胡二兩

一方前胡

厚朴一兩

炙

伏苓半兩

細辛一兩

半復

一兩

凡十物皆搗篩以蜜搗三万杵丸如梧子從

五丸起不知稍增取大便調利為度

又云治久寒積聚方

虎杖根一升許搗之以酒漬日三

飲一升

小品方云七氣九治七氣為病有寒氣怒氣喜氣憂氣

患氣愁氣熱氣此七氣為病皆生積聚堅牢如坏

在腹中心痛煩慙不能飲食時去時來發作有時每發

痛欲絕也其寒氣則吐逆心下脹滿其熱氣則怵悶

亂常如眩冒失精其怒氣則不可當熱病上邊心短氣

欲絕不得息其悲氣則積聚心下不得食飲其喜氣

則不可疾行久立其憂氣則不可苦作卧不安席其愁

氣怒忌量物四傍不復憶處四支手足跗腫不得舉

之治產生早起中風餘疾也

大黃十分オホホ 人參三分ヒトシ 枳實二分チカ 半夏三分ホソア

烏頭五分アヘ 桔梗三分アブリウミキ 細辛三分アヲネ 茺藟三分アヲネ

于薑三分アヤメ 昌蒲三分アヤメ 伏苓三分アヤメ 芍藥分オムナカ

些莖三分ハシ 其草三分アヤメ 石膏三分アヤメ 莢胡三分アヤメ 桃人三分アヤメ

凡七物治合下篩和以蜜酒服如梧子三九日三不知稍

增セ以知至十九為度イハテ 今案錄驗方有桂心无蜀椒治宿寒積聚文滿諸毒氣結逆氣腹中如環堅如石令人強健身光澤

千金方七氣湯治憂氣氣勞氣寒氣愁氣或飲食為

氣高氣或虛勞内傷五藏不調陽氣衰少逆上下方

甘草兩カラネ 桔樓二兩カラネ 夕藥二兩エヒク 枳三兩ホツク 半夏二兩

人參二兩ニ 于地黃二兩ニ 茺藟五兩ニ 八味切以水一斗

煮取三升分三服

又云神明度命丸治久病腹内積聚大小便不通氣上
搶胸腹中脹滿^{ソイ}逆若^{ルル}飲食服之甚良方大黃一兩

夕藥^{エドク}一兩^{ルリ}二味蜜丸知梧子服四丸曰二不知^{イユ}可增至

六七丸以^{知イユ}和^{イユ}為度又云脇下耶氣積聚往來寒熱

如溫瘧方 蓬鼠壤土熨之^{ムシネルアラトクナキ}令即易^{ヒヒ}

葛氏方云露宿丸治大寒冷積聚方 礬石^{カハチ}于薑

桂桔梗^{ケイコウ}附子^{ブシ}皂心^{カハフヤク}芙蓉各三兩

鵝薊蜜丸^{セラハカリ}服如梧子十九日三稍增至十五丸

僧深方治心下支滿痛破積聚欬逆不受食寒熱瘧

方 蜀椒フスシカ五分 干薑五分 桂心五分 烏頭五分

右四物治合下篩蜜和丸如小豆先鋪食以米汁服

一丸日三夜一不知積增稍一丸以知為度禁食飲

新錄方治積聚方 馬莧ムシ鴛シ汁為煎ムシ合可丸ムシ涓服ムシ

東日三

德貞常方積聚方 灸第十三推節下間相去三寸

又方灸上管穴在鳩尾下二寸又方灸胃管穴在上管下

一寸又方灸水分穴在奇脊上寸 新羅法師方

續隨子去上皮以酒一合和而服之二十七粒ハカリ量人老少

一名刺金花

用之ヲ崔禹錫食註取蔓菁子ナクネ一升ヲ搗研ヲ以水三升煮取

升濃脹之コクセシ為藥也妙旦治癥瘕也フモ治諸疝方第二

病源論云陰氣積於內復為寒氣ヲ所加ヲ故使榮衛不調

血氣虛弱ナラ故風冷入其腹內而成疝也疝者痛也成少腹

痛不得大小便或手足厥冷繞脊痛白汗出トエ或冷氣逆

上ヲ搶心腹令心痛或裏急而腸痛此諸シ惟非一故云諸

疝也八十一難云五歲謂之疝ナシ六府謂之瘕又曰男病謂

之疝女病謂之瘕葛氏方治率得諸疝少腹及陰中

相引痛如絞白汗出欲死方

鴉沙參下篩以酒服方一名白一升

寸匕立愈イユ又

又方枳二合干薑四兩水四升煮取二升去滓カ

內枳イレア一斤又剪取半升分再服又方可服諸利

九下之作走馬湯三佳又方灸心鳩尾下寸名ナツル

闕及左右各寸無百壯並

極要方療積年腹內宿結疝冷氣及諸癥癖方香

美爛豉心一升ツク

曝乾薇熬令氣香即上

小芥子一升セル

唯去石薇熬令色黃

右蜜丸空腹酒服廿五丸加至卅五丸日二服初服半劑

已來腹中覺絞ホホエ痛勿恠此是攻病之候ホリ

新錄方治諸疔方

桃白皮一升以水三升煮取一升

頃服之

又方酒服薄黃二方寸匕日二

又方搗桃人八十枚去皮研如泥酒下

又方搗大蒜

為泥酒服如棗二枚曰三范汪方治心疔灸法兩足

大指甲本甲突之際甲內各半主隨年壯

又方

灸足心及足大指甲後橫理節上及大指歧間白黑肉際

百壯則已

治七疔方第三

病源論云七疔者厥逆心痛足寒清飲食吐不下名

曰厥疔腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癰

疝寒飲^食即脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍減而痛名曰氣疝腹中痛在^太昏旁名曰盤疝腹中在昏下有積聚名曰附疝腹^少與陰相引而痛大行難名曰狼疝也皆由血氣虛弱飲食寒溫不調之所生也

錄驗方七疝丸治人腹中有大疾厥達心痛足寒冷食吐不下名曰厥疝腹中氣滿心下盡痛氣積大如臂

名曰僻疝寒飲食即脇下腹中盡痛名曰寒疝腹中乍滿乍

減而痛名曰氣疝腹中痛在昏左傍名曰盤^盤疝腹痛昏

右下有積聚名曰附疝腹與陰相引而痛大行難名曰

狼疝治方

人參カラニケクセ五分 桔梗アヲリクニキ五分 黃芩ヒニク五分 細辛アヲリノクセ五分 干薑ヒニク五分

蜀椒フセハシカア五分 當歸ヤトセリ五分 芍藥エヒルクレリ五分 厚朴ホウラクハクキ五分 烏頭ウヅ五分

凡十物治下篩和以白蜜丸如梧子先食服四丸日三

不知イニ稍增セリ禁生真猪イニ宗今葉僧深方有八物桔梗細辛桂心芍藥厚朴黃芩各一兩半蜀椒二兩半烏

喙合二分合脹タ三九日注范注任方有十二物蜀椒桂心五分分干薑分厚朴分四分分桔

梗分二分分烏喙分一分分黃芩分四分分細辛分四分分芍藥分四分分胡分一分分伏苓分一分分牡丹

治寒疝方第四

病源論云陰氣積於肉則衛氣不行衛氣不行則

寒^氣盛故令惡寒不飲食手足厥冷繞脊痛白汗出遇

寒即發故云寒疝

葛氏方治寒疝去來每發絞痛方

吳茱萸^{カラバハカア}三兩 生薑^{ナシカラバハカア}四兩 豉^{カキ}二合 酒^イ四升

煮取二升二服

小品方玄解急蜀椒^ト湯主寒疝心痛如刺繞脊絞痛^各

腹中盡痛白汗自出欲絕方 蜀椒^{フセハカア}三百枚 一方二百枚

附子一枚 粳米^{ウヅクメ}半升 干薑^{ツクメ}半兩 大棗^{オホナツメ}廿枚 半復^{ホツクア}十二枚

甘草兩 凡七物以水七升煮取三升熱服一升不覺腹脹一升

一升經心方蜀椒湯治寒疝痛腹奔^張骨方

吳茱萸^{カラハカア}升^{ヤトヤ}當歸^{キネセリ}一兩^{エヒルクル}夕藥^{エヒルクル}一兩^{ヒトクキ}黃芩^{ヒトクキ}一兩^{ヒトクキ}

蜀椒^{スセハカア}二合^{スセハカア}五味以水八升煮取二升半分三服

范汪方治寒疝腹中痛小^ス菰^ス胡湯方^ス菰^ス胡^ス半^ス斤

半夏^{ホソタミ}半^{ホソタミ}升^{ホソタミ}洗^{ホソタミ}黃芩^{ヒトクキ}三兩^{ヒトクキ}甘草^{カンサウ}三兩^{カンサウ}人參^{カウシキ}三兩^{カウシキ}

生薑^{シユウカ}三兩^{シユウカ}大棗^{ダイサウ}十二枚^{ダイサウ}擘^{ヒキ}凡七物^{ヒキ}以水一斗^{ヒキ}煮得

六升^{シユウカ}去滓^{シユウカ}服一升^{シユウカ}日三

耆婆方治寒疝積聚用力不^ア節^ア脈^ア絕^ア傷^ア羸^ア瘦^ア不^ア能^ア食^ア飲^ア此藥^ア令人^ア強^ア健^ア除^ア冷^ア氣^ア痞^ア九方

烏頭トク廿分トク

甘草カサ八分カサ 真マコト芎藭コウキウ分カサ

亭歷テイリキ八分テイリキ 薑カサ

夕セキ藥ヤク八分セキ

大黃ダイカウ八分ダイカウ 右ミドリ七味シチミ搗ト篩シ以ヨリテ蜜ミツ

和マゼ為シテ丸マゼ如マゼ

梧子コ服ハク五イ丸マ日ヒト二ニ忌イハレ猪イノ臍シ五イ辛シ生シ冷ヒヤ酢ス滑カワ

新録方治寒疝及衝心痛方 塩シホ五合

竈カマド突ツケ墨スミ三合

以水一大升煮取一小升頓服之ハルハ吐ハク老イヌ

又方水一升五合漬ヒタ豉チ一升五合絞取汁服之シ又方モウシテ桃人モウシテ

八十枚セチ去皮キ研キリ如泥キリ酒下之モ又方モウシテ桃白皮モウシテ一升以水三升

煮取一升頓服之セキ又方モウシテ以水セキ若酒服セキ乱カ髮ハ灰ハ方寸匕ハ

日ニ又方モウシテ水セキ酒服セキ伏龍肝フクリョウカン方寸匕ハ 又方モウシテ水服セキ翫カ帶タイ

葶灰方寸匕日二

又方酒五升燒鹿角一枚投酒

中分二三服之又方灸乳下一寸足大指叢毛

又方

灸

脊上三寸名大倉

十六个

脊下二寸名丹田各五七至並

要穴

又方灸上管七炷

又方灸窮脊上一寸百炷

又方灸脊中百炷

治八瘡

五方八

方第五

病源論云榮衛不和陰陽障絕而風邪外入与衛氣

管

相搏血氣擁塞不通而否也否者塞也言府藏塞不

相通也

二十

由憂恚氣積或墮墜內損所致其病腹內氣

結腹時

滿

怯熱是也其名有八故云八瘡而方家不的其

結腹時怯熱是也其名有八故云八瘡而方家不的其

願

證狀

八十一難云脾之積名曰痞氣在胃管覆之大如盤令

久不食

人四支不收莖黃疸飲食不為肌膚

今案楊氏注云痞否也言否結成積也醫門方云痞者

滿也言其氣滿痞結成積也

錄驗方治八痞癰香丸方

光明沙 麝香 丁香 曾青

各二兩

大黃七分

黃芩三分

朴消兩

亭歷五分

甘草兩

巴豆六分

凡十物鴆篩蜜丸如小豆一丸平旦空

腹脹若老人怯者同患之人脹如梧子一丸

傳信方云療秋夏之交露坐夜久腹內如羣右在腹

中痛者方

オホドメ大豆半升

クシラハカ生薑八分

右以水二升煎取

一升已下頓服其緊痞立散治癥瘕方第六

病源論云癥瘕者皆由寒溫不調飲食不化与藏氣

相搏結マツリ所生也其不動移者直名其為癥若病雖有結

既而可推移者名血トキニ為瘕也葛氏方云癥瘕病衝心不

移動飲食痛者死又

新録方云治一切病溫白丸方南

州刺史臣陰鏗言カウツリ臣蒙慈澤視事三年自到任官

以来臣妻不便水土有地下濕遂得腹脹病項年已

來恒遣醫師療治ル於今不イユ差有一蒼吳道士名材勝

到巨剛堺採藥トル巨遂ツ呼道士至トキニ舍ツク說トク巨專妻病狀于時道士昂ツ与ツ巨藥方用治万病無不得ト老

紫莞ツ二分 吳茱萸カラハカア二分 石菖蒲ホト二分 厚朴ホト二分

桔梗アサ二分 皂莢シロ二分 馬頭アサ十分 伏苓アサ二分

桂心アサ二分 干薑アサ二分 黃連カク二分 蜀椒アサ二分

巴豆アサ二分 人參カラニク二分 苤胡アサ二分

右十五味鳩下篩為散用好蜜アサ和更鳩アサ三十杵丸

如梧子大オホキ丸ヲ二九不知アサ稍增アサ可至五九アサ以為度アサ當下心

腹積聚久癰瘕塊大女アサ坏アサ梔黃アサ疽宿食朝起臨吐

四支痛上氣時之腹脹心堅結衝心傍攻兩脇徹背連

胸痛無常葢繞吞痛狀如虫鑽又治十種水病八種

及胃吐逆飲食噎塞或五淋之病或九種心痛久治積

年飲食不消化或治婦人不產及新緒多年又治卅

種乍寒乍熱治一切諸風體如頑痺不知痛處半為

疼痛或眼中生淚或如錐刀所刺鬚髮墮落或面上

癢如虫行莫不見或手足煩熱或夜卧不安治

七十種風又治卅種瘰癧或大人顛小兒廿五種驚癇

又治五耶夢鬼相通或四支沉重不能飲食昏嘿

渠井及強急也

又瘰癧及病也

紫

口紫只欲取死或差或劇似真鬼還終日憂愁
情中不樂或恐或懼悲啼飲食無味婦人月水不調
或多或少或真似懷盈知子或連年累月羸瘦困
弊遂致於死或哭或歌為鬼所亂但能服此藥莫不
除愈巨知驗合藥與婦人服之十日下出瘕瘕虫長尺五寸
一枚下膿三升其病即愈巨見被墮傷臨死有積血
天陰即發羸瘦者床不能食飲命在旦夕服此藥十
日五九至十五日當下鷄肝黑血如手指者二百斤白膿二
升赤黃水一升病即愈平安狀如常主薄陳勝累有

心腹脹滿經十四年瘦疲氣悶飲食不下巨与此藥

服（ハルコト）十日下青虫六十枚大小如樹葉頭赤虫身黑下膿

三升許病即愈（ヌ）巨公曹常患著床以經數年服此

藥世曰（ナ）下（ハ）完蠅蝦百枚有出青黄水一斗病即愈（ヌ）

臣門師姪長多羸瘦著床食便吐出命在朝夕

從臣求藥服五九至十五日下出完蝦蟆十枚青水

一斗其病即愈巨家內有人常患心病葢無時節

葢即欲死服此藥五六日（ハ）下完蛇二枚各長尺五寸有頭

眼未有童子斑有文其病即瘳（ヌ）巨治尼專得大風肩

墮落已經二年遍身出瘡狀如錐刀所刺カキ與藥服九至

一月日出癥虫五色シ凡三升許其病即愈眉鬚遂生至復

如故モト臣知方大驗死罪謹上也ア服中禁忌冷水生菜生菓

猪フク宗滑陳臭物五辛タキ僧深方玄消石大丸治

十二癥癥及婦人帶下絕產無子及欲服寒食藥而腹中有

癥瘕癥辟實者當先服消石大丸下之下此丸不下水穀但下下

病可源不源令人極也源河西大黃オホ八兩オホ朴消六兩

上黨人參二兩甘草三兩カ凡四物皆各異カ搗下篩

以三歲好苦酒カ量銅器中以竹箸カ柱銅器中カ一升作一刺

凡三刻以量空先內大黃使微沸盡一刻乃內餘藥復盡
一刻餘有一刻極微火便可丸乃令如鴨子中黃
欲合藥當先吞或一宿勿令小兒婦女奴婢見也
欲服者二丸若不能脹大丸可分作四丸未カチハクル不過四丸藥
丸欲大欲令細能不分又善若人羸者可小食強者不須
也若婦人服下者如鷄肝如米汁心黑或半升或三
升下後慎風寒作一坏酒粥食之然後作羹各及腫自養
如產婦法六月則有子禁生菓脂セヒ辛菜カラシ若服
寒食藥者如法不与餘同也

千金方治癥瘕方

灸內髎課後宛々中隨年壯

又方灸氣海穴百壯在脊下一寸半

又方櫛カ白皮カ剪ハキ

合可丸脹之取イ元エム知病動若下減之セハ

又去治癥堅心ハセリヤメヲウチ

下如坏食則腹滿心絞腹痛方

亭歷子二兩ハセリヤメヲウチ

大黃二兩

澤漆四兩ヤヒトクサ

三味各異搗五百杵下篩ハセリヤメヲウチ

治亭歷子ヲハ令膏下二物本草摘葉有白汁故曰殷搗ハキ五百杵和以蜜服ハセリヤメヲウチ知梧子ハセリヤメヲウチ元ハセリヤメヲウチ

不知イエ稍增セ以知イタカ為度暮氏方集

釜方同之

腎門方療癥瘕

腹內脇下小腹脹滿痛冷昂葭其氣上衝心トホリ

不能飲食或欬逆氣急煩滿方ホソクア半夏十分クレハハカア生薑十分

大黃十二分

檳榔十分

人參カニシキ八分

吳茱萸カフハカア六分

厚朴ホカハ二分

桔梗アリノヒナ八分

伏苓ツツボト六分

枳殼カラタチノカハ六分

大棗十二枚

水九升煮取

三升下大黃更煮三沸分溫三服相去

八九里當利三二行

廣利方理癥瘕腹脹滿堅硬如石臍上青脉浮

越方

紫葛エヒカワラ八分

赤芍藥六分

桔梗アリノヒナ六分

紫

莞頭廿五枚

青木香六分

水路呵梨勒皮

六分栳李イノセシ十分

蜀大黃セリ七枚

牽牛子アセカホ四分

擣篩蜜丸如梧子空腹服十五丸ハナハナ 忌陳夏黏ネエ

贖猪宗贖猪宗

葛氏方治心下有物大如杯不得食者方享歷二兩ハナハナ

大黃二兩障沫四兩オホ 擣篩蜜丸ハナハナ 梧子千杵服如梧子二九日三ハナハナ

治暴癰方第七オホ 病源論云暴癰者由藏氣虛弱食オホ

生冷之物藏既本弱不能消之結聚成塊卒然而起オホ

其生無漸名之暴癰也 極要方療卒暴癰腹中オホ

有物堅如石痛如刺晝夜啼呼不療百日内皆死方

大黃半斤 朴消半斤 右先擣大黃為散然

後和一 朴消以蜜合令相得於銅器中置湯上

煎令可丸ハカリ如梧子大ハカリ酒飲任性服廿九日二不知

加之以知為度今安葛氏方朴消三兩
范汪方有白蜜丁斤半葛氏方治卒

暴癥腹中有物カタク石堅如痛如刺晝夜啼呼不治之

百日死方取牛膝根二斤サウソウ曝令小干以酒一斗漬之

密塞器口ウケイカニ舉署オイ契灰中温之令味出先食服五六

合至一升以意量多少ハカリ又方用薤ソクトク薤根ヲ如此丸良

又方多取常陸根イヌハハ搗ハ蓋之以新布ヲ藉腹上以藥披

著布上以衣覆上オ冷復易之晝夜勿息ヒ千金集

驗方同之。又方取席杖根一升于搗酒漬飲之。從少起。曰三佳。此酒治癰力勝諸大藥。

新錄方治暴癰。必在心脇下。欬逆不下食。或下不斷。

方 吳茱萸カラハノカマ三升。碎之以酒和者。令熱布帛物裏以熨。

癰上冷更炒更燔用之。癰當移走復逐熨。

須都消心。又玄暴癰。堅脹如石。痛欲死者。方取鼠壤。

玄黍キア穰カラ二物。亦分相和。並炒逆熨。病上取差。又方單用。

暴鼠壤玄ホ三好。又方伏龍肝如前方。又方。

病在上。脹諸吐。藥去之。病在下。宜利療之。

本草替疑云鴆莎草汁及乾未服之

治蛇瘕方第八

病源論云人有食蛇ヘ不消目腹内生蛇瘕也ホ有蛇之

精液誤入飲食之內クチナハ令病之其狀常苦飢而食則不下

喉噎塞食至胸內即吐出其病在腹摸ハカリ揣モミ有蛇狀謂

揣物委
下果
ニ又
度高小曰
揣ス誠也

之蛇瘕

新錄方治人食蛇不消生蛇之精液入飲食中令人病之

腹內有蛇狀名之蛇瘕方 濃作コナク蒜ニンニク麤モロコシ吸ヒキ一升以上陶

玄餅クハ店タナ蒜ニンニク麤下蛇之藥非虛望之 又方鴆カクハ酸草

和名野餅字也

鳩取汁服八合

又方大豆葉鳩取汁服一升

又方常思草鳩服如上並頻之取老千金方治蛇瘕

方白馬毛切長五分以酒服方寸匕大者自出更服方

寸匕中者三出更服三方寸匕小者復出不可一頓

多服斂人又玄治蛇瘕太黃湯方 大黃半兩

烏賊臭骨二枚皂莢カハラチヲキ六銖芒消ハカリ如鷄子一枚黃芩半

兩甘草大如大指一尺 六味以水六升煮之三沸去

滓カヒ內芒消トコラヘ適寒溫盡服之十日復莫煮作如上法飲

服之一宿勿食平旦服當下病也又玄治蛟龍病方

開皇六年有人二月八月食芥得之其病茲似顛

面色青黃腹寒食強錫三升曰二吐出龍蛟有兩

頭大驗

廣濟方同之今案病源論云五月八月蛟龍子生在芥菜上人食芥不幸隨食入腹變成蛟龍

治龍

瘕方第九

病源論云瘕瘕者謂腹內瘕結如瘕狀是也

有食瘕觸冷不消而生者必有食諸雜物得冷變

化而作者皆由脾胃氣虛弱而遇冷則不能尅消所

致瘕之言假也謂其有形狀而推移者也廣濟方療

龍瘕方

白馬尿一升五合溫服之令盡老葛氏方治瘕瘕

伏在心

下手棉見頭足時轉勤者

白雌鷄一雙絕食一宿

明魚膏アフラ煎飯飴之取其矢クソ無多少於銅器中ハリ溺

和火上放可搗イグ末服方寸匕日四五須消盡乃心恒飴カト

鷄取矢トシ老畢イモ斂鷄單食

千金方治驚癰

方藍葉一斗ソイ搗水三升モ絞取汁服一升日二又方白馬尿奇

一斗牛飲鷄子三枚取白合煮取二合廣濟方同之空服腹之

新錄方治驚癰カハメ癰團々似驚有脚能動數衝心ツイ痛者

方取蒴藿根ソク白皮カハ搗三升以水五六合和攪攪取汁服七

醫心方

トシ

八合吐

又方搗藍汁服七合

又方單服白馬尿一升日二治臍瘕方第十一

病源論云人有胃氣虛弱者食出臍生因為冷氣所搏

不能消之結成瘕瘕之有形狀如臍也是有飲陂湖之

水誤有小臍入腹人不幸便即生長久有形狀如臍養生方

云臍赤目作贈食之生瘕也新錄方治人食生臍不

消又飲湖水誤小臍入腹不幸生長名之臍瘕方

炭火燒木依毛介為灰湯或酒中服方寸匕日二又方

燒臍鱗或為灰湯若水服方寸匕日二又方燒羊

久臍細為灰水服方寸匕日二又方白馬尿服六リク并

又方糞橋皮湯脹之 又方豉汁脹 糞皮末方

寸七日三

葛氏方治食臭膈及生宗任胸中不消成癥方

朴消如半鷄子者一枚 大黃二兩 凡二物以酒二升

糞取一升半盡脹之 治肉癥方第十一

病源論云人有病而常思得_{得肉}宗_得託又思之名為

宗癥千金方治宗癥思宗不已食託復思方 空腹

飲白馬尿三吐_吐升_升出之 新錄方治宗癥方 飲服大

豆黃末一匕日二又方濃豉汁服一升日二又方糞_糞菰菜濃

汁脹之

治髮廢方第十二

病洎論云人有因飲食內誤有

頭^食髮隨而入成癥胸喉間如有虫下上去來者是也

廣^唯潘方療髮癥喉欲飲油方油一升右香澤剪矣

鉢勞^{タケハ}貯安病人頭邊

今口鼻臨油上勿令^得飲及

傳^{ツクル}鼻面並令香氣叫^{ラヒ}喚取飲不得必當疲極眠^ル睡

髮癥當從口出飲油人守視之并捉石灰一裹見癥

出以^{イテ}灰^{イテ}粉^{イテ}捉^{イテ}癥^{イテ}抽^{イテ}出^{イテ}須臾油盡即是髮也一初從腹出

形如不流水中濃菜隨髮長短^如之。

○今案千金方云凡發藏者唯飲油也
○日中乃至三五升不飲食以此為病
又玄療胸喉間竟有癰虫

上下偏聞カ葱豉食香此是發虫故也油煎葱豉置口邊行

術二日不食張口而卧油煎葱豉以置口邊虫當漸出

徐カ引去之カ無所忌

新錄方治發癰方滿食竟便吐者是成カ煎猪脂二升

酒二升煮三沸一服一升日二取吐發利癰出乃カ又方飲白馬

尿八合日一カ發癰令食竟便吐餘癰則不然カ上千金方

治米癰方第十三カ病源論玄人有好啞米轉久弥嗜啞

之若不得米則胸中清水得米服水便カ米不消カ遂生

癥結

千金方治水瘕恒欲食米方

鷄矢一升白米

五合二味

合炒イリヌ

令米焦コカセ

搗末水二升

預服モ

之須臾

吐出

病碎

米ミ若無米ミ當出淡

今案新錄方云水三升和攪預服之

當吐米不盡更服之大良

治水瘕方第四

病源論云水瘕者由經絡

否滯

水氣停聚

在於心下

腎經又虛不能宣利洩便致令水氣結聚而成

瘕

在於心腹之間

按作水聲但欲飲而不用食遍身

虛腫是

范汪方治水瘕病心下如數斗油囊累水

作聲曰飲二三斗不用食但欲飲久病則瘕堅有蝦蟆

遇寒三五

蟹治之方

草麻カラカシ孰成好者廿枚セツ去皮坏中研令チ孰

不用并列擣水モトイ解得三合宿不食清旦一頓セ服盡日中許當

吐下清黄如葵汁果衣ツメル當囊結裏ヒ若病不盡却三日更增

服廿枚草麻如上法オク若病故復不盡復增十物物枚服如

上法其以盡病為限藥但去病不令人悶ワタシ乱下病之後填不

可飲ヤミヌ當五日ラム斷飲白糜カ用高方已神良チ

治食癥方第十五

病源論云有人卒大能食乖其常分因飢值生慈便大

食之仍吐ハク一宗塊メクレルホトリニ繞畔有口其病即愈イエヌ故為食癥特由不

事致此疾暴成癥非飲食生冷過度之病也

廣浴方療食癥方

有人一食飯七斗并半猪餅

燔並不論因苦飢於葱中過飢急即食生葱須臾吐

出一空薄而圍繞畔口無數昂以食投之三消盡飯七

斗乃心吐此物後其人食病便愈此名食癥無所忌治消

癥方第十六

病源論云人有性嗜酒飲酒既多而食穀常少積

久漸瘦其病遂常思酒不得即吐多睡不復能食

玄是胃中有虫使之然名為酒癥

今案諸方無治酒癥之方以此諸癥之方可治之新錄

方治諸瘕方

灸旁光俞三百壯已上

又方酒若飲

服自駿血灰

又方搗麴末酒飲服之曰二

又方事歷子

玉井熱

以酒二升漬

又方搗麴末酒飲服之曰二

又方

亭歷子ハタカナ

三升ハタナ

以酒二升漬

又方搗三日溫服半

蓋曰二水病證ハタナ惟第十七集驗方玄黃帝間

於岐伯曰水与膚脹

鼓脹

腸覃石瘕石水何以

別之岐

伯曰水之起也自果上ヤウヤウ微腫如新卧起之狀頸脉動

時欬陰股間寒足胫腫腹乃大其水已成也以手案腹隨

平而起如裹水之狀水膚脹者寒氣客於皮膚之間鼓

然不緊腹大身盡腫皮厚案其腹陷而不起腹色不變鼓脹者腹身皆腫大^キ与^セ膚脹^ヒ也其色蒼黃腹脉起^ル腸覃^者寒氣客^ス於少腹外与衛氣相薄^ス氣不得營因有所繫瘦而内着^ツ惡氣乃起息^ル矣乃生始也大如鷄卵稍以益大至其成也若懷子之状久者離^フ歲月案之則堅椎之則移^ル月事時下^ル名瘕^者生於胞中寒氣客於子門^ニ閉寒氣^{トキニハ}不得通惡^ス益當寫^モ而不留^ル日以益大状^ハ子如懷^ハ月子月事不以時下皆生於女如子^可導而下

今案石水之證無本方病源論云石水者四交小腹獨大其根在膀胱小品方云先從胃腫名曰石水其根在脾^{ハリフク}腎門方

辨曰近驗九二水病者小便皆澀或黃赤不出溢入經絡致

令腫滿名為水病療法以利小便藥不老則以利大便藥

則愈イニ若目服利藥便利不可セ者是死候也又云若諸皮

膚水脹者服諸葢汗湯得汗即愈イニ須慎風冷及鹹食

宜食鯉鱧ニ臭茺ニ小豆ニ利小便物為佳

葛氏方云水病膚黑昏突出死水病脉出者死千金方

云水病初起兩目上先腫如老蠶色頰頸脉動股裏冷

脛中滿按之沒指腹中轉側有聲此其候也又云水病忌

腹上出水者一月死太忌之イニ又云水病忌產乳音

樂房室誼戲一切臭一切寒生冷酢滑蒜粘米豆油臍用力オシロイヒヤシメオシロカユモヲイラアルホヨカナルモノ

治大腹水腫方第十八 病源論云夫水腫病皆榮衛否水腫者

澀腎脾虛弱所為而大腹水腫者或因大病之後或積

虛勞損或新熱食竟入水自潰及浴冷水氣不散流アヲホク

溢腹外三焦閉塞小便不通水氣結聚於內乃腹大而

腫故而支小腹陰下濕手足逆冷腰痛上氣欬喘煩疼故云ヒルメ

大腹水腫千金方治大腹水腫氣息不通命在旦一夕

者方牛黃一名生黃二分昆布ヒロメ十分海藻三升メ十分牽牛子アセカホ八分桂

心八分枳實ヲメ三兩五亭歷ハナカリ六兩ハナカリ七味別ハナカリ鳩亭歷ハナカリ訖ル如

膏合ハキリ和丸ハカリ如梧子飲服十九日再稍加ハナ小便利為度

醫門方療大腹水腫遍身洪滿小便澀ハナ少方海蛤ハナ

六合ハナ研如麵ハナ亭歷子ハナ十分ハナ熬伏苓ハナ六分ハナ橘皮ハナ四分ハナ郁李ハナ人四

分ハナ桑根ハナ白皮ハナ五分ハナ甘遂ハナ二分ハナ漢防ハナ己ハナ六分ハナ橘皮ハナ四分ハナ

檮蒰為散別檮亭歷子如指內散中蜜丸空腹飲

服七九日一當利一二行如不利加ハナ一丸以利為度

忌猪ハナ宗大醋ハナ油ハナ臍ハナ食ハナ新錄方治水病腹大

面腫小便澀方亭歷子ハナ一升ハナ熬ハナ芒消ハナ三兩ハナ吳茱ハナ

黃三合ハナ鵠ハナ為散ハナ合三種ハナ一更ハナ鵠ハナ加少蜜可丸ハナ鵠ハナ二千杵ハナ

飲脹七九日二服以小便利為度忌鹹酢老心若熱水

四支煩心胸熱悶者去茱萸効驗方治水大腹亭

歷子散方藍葉三兩ヤサ大黃一兩半オホホ亭歷子二兩ハナカネ

九三物治諸先食酒脹二方寸匕欲丸服蜜和服如大豆

日廿丸小品方治水腫大豆湯方大豆三斗

水五斗煮令熟出豆澄汁更內義酒五升微火煎如飴

服一升漸增之令小下耆婆方治人痲病四支脚カサ面シヤ

腹俱腫方香薷二百斤以水煮之令熟去滓オホ更煎令

如飴カサ糖少服之當下水小便數即差イユヌ

又云治人多水身重口中水出面虛越腫且寫方

桂心一兩半

大腹楨榔三七ハチ挺ハチ研ハチ

生薑ハチ一兩半

三味ハチ切以水九升ハチ煮取三升ハチ分三服ハチ當

下ハチ水ハチ即ハチ差ハチ

葛氏方治大腹水病方

防己ハチ甘草ハチ亭ハチ歷ハチ各二兩

檮ハチ苦ハチ酒ハチ和服ハチ如梧ハチ

子三九ハチ曰三恒ハチ將之取都消ハチ乃心ハチ又方白茅根ハチ一大把ハチ小豆

三升水五升者託ハチ去茅根食豆水隨小便下ハチ又方恒

散ハチ小豆飯并汁佳ハチ本草經云獭ハチ穴主冬水脹不ハチ

老垂死者イエルル作養食ヘ之下水大効シルイリ提要方療大水腫神

方白錫四兩桂心一兩棗根六升甘草一兩人參一兩

細辛一兩大棗十四枚右以水九升煮棗根取三升以煮藥

取一升去滓去內錫令洋盡分三服一日一夜小便五六升是

龍門方療腹滿如石積年不損方取白楊樹東南

皮去武校蒼セ謹風細セ押イリ削イリ五升イリ趁イリ令イリ黃イリ酒イリ五升イリ熱イリ淋イリ託イリ以イリ絹

袋イリ盛イリ滓イリ還イリ內イリ此イリ酒イリ中イリ密封イリ再宿脹イリ灸水病法イリ小品方イリ玄

灸辜俞百壯在第七椎下灸脾俞百壯在十一椎下灸意舍

百壯在當脊孔中央是也治通身水腫方第十九

病源論云癰病者由腎脾俱虛故也腎虛不能宣通水

氣脾虛又不能制水故水氣盈溢添液皮膚流遍四肢所

以通身腫也ハル僧深方治通身水腫大小便不利方常陸根イワルキ三升

赤小豆一斗九二物水一斛煮取一斗稍飲汁食豆以小

便利為度ハヤヒトクモ又云治大水面目身體年足皆腫方大戟分

亭歷ハヤセリ三分ハヤセリ苦參クサ一分葱花一分九四物治下篩以小麥粥服

方寸匕良効范汪方治身體流腫心下脹滿短氣逆安

飲食方大豆一斗以水三斗煮之令得一斗七升去滓セキ內斗

好酒令煎之令得一斗七升服一升日三經心方馬脾湯治一身

馬脾湯

面目浮腫方

未亭歷彈丸范 六ツカタナ

大棗廿枚

水三升煮棗

取汁一升半七升去棗ナメ內亭歷者取一升頓服之得至五服若

帶水氣者先服青龍湯一劑乃服之今案醫門方亭歷子兩
葵大棗廿枚水一斗云

張仲景方青龍湯四治支疼ヒツキク痛面目附腫方ハレ麻黃半斤カハネクセ

去節 去沫細辛二兩アズネクセ干薑二兩ヒキノヒタセクセ半夏ホソクア二兩洗凡四物切以水八升下ラ

煮得二升一服又玄治脾胃水面目手足附腫ウチ胃營カク堅大

滿ククチンカハ樞氣不能動搖素根白皮湯方ククチンカハ素根白皮切二升桂

一尺生薑クレハカニ三顆カクチンカハ人參一兩凡四物切以水三斗煮取棗根湯

得一斗絞去滓イホリセケ內桂人參生薑黃飴十兩煮之竭得七升服

外消息更服今案本草挂一尺重半兩為正

醫門方療遍身腫脹小便混方

亭ハナタカナ歷子二兩煑搗如泥大棗ハナタカナ廿枚七枚

水一大斗煮取一小升絞玄ハナタカナ滓內亭

歷子於棗中以微剪攪カハム勿停ナクシテヤアハル手ハナタカナ可丸ハナタカナ

止丸ハナタカナ如梧子ハナタカナ空腹頓服ハナタカナ令盡ハナタカナ當利ハナタカナ一二行ハナタカナ

差ハナタカナ分二服ハナタカナ六効ハナタカナ

治十水腫方第廿

病源論云十瘰者青底赤瘰水黃瘰水白瘰水黑瘰水懸瘰水風

赤^水石^水赤^水裏^水赤^水氣^水赤^水也青^水赤^水者先從面目腫遍一身其

其^根在肝赤^水赤^水者先從心腫其根在心黃^水赤^水者先從腹腫其

根在脾白^水赤^水者先從肺腫其根在肺黑^水赤^水者先從

足^水跌腫其根在腎懸^水赤^水者先從面腫至足其根在膽^水風

赤^水者先從四肢起腹滿大目盡腫其根在胃石^水赤^水者四肢

小腹腫獨大其根在膀胱裏赤^水者先腹滿其根在小腸

氣^水赤^水者^{タチ}盛^水虛^水來^水去其根在大腸皆由榮衛否

澁^水三^水雖^水不^水調^水府虛弱所生並令身體虛腫喘息上氣小

便黃澁^水也^{今案諸方十水之名各不同}小^水品^水方^水十^水水^水丸^水治^水水^水腫^水方

腫從頭起名為白水其根在肺^{ハシカタ}肝目主之腫從胸起

名為黃水其根在脾^{ハヤヒトク}甘遂主之腫從面起名為青

水其根在肝大戟主之腫從腹起名為氣水^{ハヤヒトク}下實^{口擧及}下

虛其根在腸^{オシクセ}芫花主之腫從股起名為黑水其根在

腎玄參主之腫從面起至足名為懸水其根在膽赤

小豆主之腫從內起^{オホキミ}堅塊^ク四支腫名為石水其根在膀

胱^{ハヤヒトク}素根主之腫從四支起腹腫名為風水其根在胃澤

漆主之腫從腹起名為冷水其根在小腹^{ハヤヒトク}巴豆主之腫

從胸中起名為赤水其根在心^{ハヤヒトク}亭^{ハヤヒトク}歷主之^{ハヤヒトク}石十種隨其

病始所在增其所主藥ルル皆一分巴豆四分去心皮治末合下

篩蜜丸服如梧子三丸得下為度不下日三セテ可作

散末食服半錢上大便利明朝復服如法再服病愈イニナハ

即禁飲食但得食于糞可又去下水散治水腫方先從

脚腫名曰清水其根在心亭ハシタカナ懸子主之先從陰腫名曰勞

水其根在腎澤漆ハヒシタカナ主之先從腹腫名曰冷水其根在大腸蜀

椒主之先從面目腫名曰氣水其根在肺素根主

之先從手足腫名曰心水其根在小腹腸巴豆主之先從口脣

腫名曰黃水其根在胃大戟主之先從脇腫名曰飲水其

根在肝莖花主之ハナハナ——先從腰腫名曰肝水其根在臍甘ハナハナ

遂主之先從胸腫名曰石水其根在脾伏苓主之ハナハナ先從

從背腫名曰鬼水其根在膽雄黃主之 右十物分等

至十水隨腫所從始案方偏加藥二分合擣下篩空腹

以水服方寸匕當下水多者減服下少者益之セ 范汪方

治十水丸方 第一之水從先從面目腫遍一身名曰青

水其根在肝大戟主之ハナハナ 第二之水先從心腫名曰

赤水其根在心亭子主之ハナハナ 第三之水先從腹腫名曰

黃水其根在脾甘遂主之ハナハナ 第四之水先從脚腫名曰白

水其根在肺葉本主之

第五之水先從足跌腫名曰

黑水其根在腎連翹主之

第六之水先從面腫至足名曰

玄水其根在膽芫華主之

第七之水先從四支起腫滿

大本身盡腫名曰風水其根在胃澤漆主之第八之水四支小其

腹腫獨大名曰石水其根在旁光素根白皮主之

第九之水從腸滿名曰果水其根在小傷巴豆主之

第十之水乍盛乍虛去名曰氣水其根在大腸赤

小豆主之凡十病藥皆主之分等所病形同倍之治合白

蜜丸如小豆先食服一九曰三飲下病服三九人弱者以意減

之治宿食流飲寒熱濕病禁葷菜嗜寒生菓不禁就之

僧深方治身體浮腫十水散方 芫花三分 決明三分

大戟三分 石韋三分 巴豆三分 澤瀉三分 大黃三分

鬼臼三分 甘遂三分 亭歷三分 凡十物治下 葭以太麥

粥清汁服方寸匕 治風水腫方第廿一

病源論云脾胃虛不能制於水故水散溢皮膚又

與風濕相搏故云風水也令人身浮腫如裹水之狀按

腫上凹而不起骨節疼痛而惡風是也

小品方葱豉洗湯治虛熱及石契當風露卧冷濕傷肌

玉側及方言積也盛也統也

熱^{ハツ}瘧在裏^{ハツ}變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下頭小

便不利^{ハツ}太便難^{ハツ}四支腫如皮囊盛^{ハツ}水晃^{ハツ}如老蜚色^{ハツ}陰^{ハツ}痺^{ハツ}安

胡廣云老蜚形也

腫如斗莖腫生瘡如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷濕

損脾胃故也^{ハツ}內依方脈諸利水藥外宜以此湯洗四支竟^{ハツ}以

葱損脾胃故也^{ハツ}內依方脈諸利水藥外宜以此湯洗四支豆

膏傳之^{ハツ}別以猪蹄湯洗陰莖創爛處及殍腫也

葱合青白切^{ハツ}一升^{ハツ}茯苓子^{ハツ}一升^{ハツ}春碎^{ハツ}赤小豆^{ハツ}一升^{ハツ}菰菜

子^{ハツ}一升^{ハツ}春碎^{ハツ}茺藿切^{ハツ}五升^{ハツ}巴豆^{ハツ}一百枚^{ハツ}合心皮^{ハツ}打碎^{ハツ}

右六物以水一石二斗煮取八斗以淋洗身腫處^{ハツ}葱^{ハツ}豈^{ハツ}膏猪

蹄湯方在本方又去亭厯子迴神消治風水通身洪腫

宗如裂者服之小便利自隨消方 春時讓清酒五斗

一方五斗亭厯子三斗熬著酒中漬再宿便服一合以

漸增之病去小便利腫自消滅皮縮也神良有驗若不能

得春酒餘極好酒三佳 槎要方治風水毒氣通身

腫方 猪白皮三兩 桑根白皮五兩 橘皮一兩

紫蘘二兩 生薑四兩 大豆三斗 右以水九斗煮取

一大斗分四服三劑百日内忌鹹醋 經心方治風水大豆

煎生桑根白皮細切三斗入土一尺者大豆二斗二味以水

六斗者取一斗去滓下生薑汁二升更煎取四升分五合

第一服日三夜一以知為度又玄牽牛丸治脚腫滿步行

不能衆惡毒水腫方大黃二兩朴消三兩去牽牛子

七兩去杣人二兩去于薑二兩半人參二兩橘皮兩半

右七物搗下篩以蜜和春万杵服如梧子廿九以微利為

度腫即止不差盡割者万毒万病廿八種風耶恙愈

用甚驗禁冷水猪宗僧深方治風水腫癥瘕當

陰消方當陸根一升凡一物以淳二斗漬三宿服

一升當下者減後半升起日三不堪消者以意減之

又玄治通身腫皆是風虛水氣ヲナリ治暴腫痛蒲黃酒方

蒲黃カクハナ一升小豆一升大豆一升凡三物清酒一斗煮取三升

分三服者婆方治人風水氣面俱腫上氣腹脹不能

食羸弱在床經時不老者方小豆三升大麻子三升

搗碎以水研汁キレン棗根白皮一升合煮クハネ豆熟食豆飲汁

即大下水即老イユ蘘敬本草注者アユ鮓食之主水浮

腫又方服鴨肪食鴨頭主之水腫又万棗灰汁モ煮大豆

飲之下水腫治赤癰方第廿三

病源論玄麻痺由飲水漿不消水氣結聚而成痺在於兩

脇之側轉動便痛不耐風寒不欲食而短氣是^九以癰者^ト
者^ニ謂癰側在於脇間故受名焉^ニ効驗方云可脹諸下

藥^ニ寫之^ハ玄感方灸挾脊兩旁各廿壯又方灸兩乳下

一夫助間二穴^{ナカハツオホネ}新錄方杏人作煎或作九酒脹如來日三

又方灸桃人^{モノシホネ}准上又方單灸大麥蘗^{モヤシ}為散脹如上

本草經水研草麻子廿枚脹吐惡沫也

治身面卒腫方第廿三 病源論云身面卒洪腫者

三^水瘰^{シム}病之候也脾虛不能制水故水流溢散於皮膚

令身體卒然洪腫 范汪方治卒腫大戟洗湯方

大戟ハヤヒトク四兩 莽草キア二兩 茵芋シカク二兩 大黃オホホ二兩 黃連カク二兩

芒消マシヨウ二兩 亭歷アチヤリ二兩 皂莢カハラフチクキ二兩 凡八物皆サヤカシ以水ミヅ一斗

五升煮得シシヤナ一斗絞去滓シシヤナ洗腫カハラス上日三サヤカシ 又云治諸卒腫ツ一

風掣ヒキセキ痛方 未芥子ヒキセキ溫湯ヒキセキ和塗ヌリ帛上ヌリ以ミ焙カカ復ヒキセキ易ヒキセキ

不堪其痛ルミシキ契者ルミシキ小塗ルミシキ之ルミシキ已試良 僧深方治暴腫ヒキセキ方

破カ鷄子カ攪カ令其黃カ白カ塗腫カ上カ焙復塗カ大良カ

又方大豆カ牙カ齧カ煮カ飲カ汁カ食カ豆カ不カ過カ三カ升カ良カ 落手方治暴腫方 擣亭歷子カ薄之カ兩三過昂消葛カ

葛氏方治卒腫身面皆洪大方凡此腫カ或是虛氣カ或

是風冷氣カ或是水飲氣カ此方皆治之 用大鯉魚カ一頭以

淳苦酒三升煮之令苦酒盡乃食ハ莫勿食飯及塩敗他
難也不過再作便愈又又方大豆二升熟煮漉飲汁食豆不
過三作必愈イニ小豆三佳又方大豆一斗以水五斗煮取二斗去豆
內酒八升更煎取九升分三四服腫老後渴頓不可多飲
又方葵豆內踝下白突際三壯又又云治腫入腹苦滿急安飲食方
亭曆七兩枳目三兩伏苓二兩吳茱萸二兩ハカ枳蜜丸ハカ如梧子
服十九日三又方大戟烏扇木各二兩ヤヒトモ枳蜜丸ハカ如梧子旦服
二丸當下又又云若腫從脚起稍上進者入腹則斂人治之方
生豬肝一具細切頓食勿与塩乃可用苦酒耳又又方煮豉汁

飲之以滓薄肺治犯去腫方第廿四

病源論云犯去之病由居住之處穿鑿地云犯觸去氣而致

病也令人之肌突頭面遍體盡氣急也謂之犯去新錄方

云以水脹伏龍肝方寸匕此主犯土上氣兼腫大好本草拾遺云

藥有同類相伏者不伏水五服云以此案之以鼠壤土垂壁云

腫上可善治黃疸方第廿五

病源論云黃疸之病此由酒食過度府藏不和水穀相并

積於脾胃傷為風濕所搏痰結不散熱氣鬱故食已

如飢令身體面目爪甲及小便盡黃而欲安卧若渴而疸

者其病難治。疸而不渴。其病可治。葭於陰部其人。

必臨葭於陽部其人。

郭其又振寒而葭熱也。葛氏方云黃病有五種。謂

黃汗黃疸穀疸。疸疸。疸女勞疸也。又云治黃疸一身

面目悉黃如橘方。生第根一把。細切以猪突一斤。合

羹盡食。今案范汪方治年六十以上一服。又方。搗生麥苗水和。絞取汁。服三

升。小麥勝大麥。今案范汪方不和水。范汪方治黃疸茵陳湯方。茵

陳蒿六兩。大黃二兩。文子十四枚。凡三物水一斗。升先煮

茵陳蒿。減六升。去滓。內大黃文子。煮取三升。分三服之。

小品方治黃疸身目皆黃カク皮膚翹塵カク出三物茵陳湯方

茵陳蒿一把ヒキウキ交子カク十四枚カク石膏一名細石一斤カク凡三物以水八升煮

取二升半去滓カク石膏一斤カク猛火燒令赤投湯中沸定

清取汁適寒溫カク脹一升カク汗出乃愈カク千金方治黃疸

身體面目皆黃カク三黃散方カク大黃四分カク黃連カク四兩カク黃芩カク四兩カク三

味カク末カク先食カク脹方寸匕カク日三カク今素范汪方カク凡如梧子カク脹十九カク又本草拾遺カク云藥有同類カク伏者身黃カク脹黃物カク

錄驗方治黃疸カク大小便不利カク面赤汗自出カク此為表虛裏

實カク大黃湯方カク大黃カク四兩カク黃蘗カク四兩カク交子カク十五枚カク

消石カク四兩カク凡四物切以水一斗煮得二升半カク去滓カク內消石カク復

煎之得二升分再服得快下乃愈 又方蕪菁子五升一

末服方曰三

醫門方療黃病身體面目悉黃如橘由暴熱外以冷迫

之熱因流入胃中所致方文子人三兩 栝樓二兩 苦參二兩

龍膽三兩 大黃三兩 檮篩蜜丸飲服廿九日三加至五六十丸

廣濟方療五種黃方 丁香七枚 伏帶七枚 赤小豆七枚

為散取暖水一鷄子許和一錢七服之忌諸熱食

經心方治黃疸單方搗枳合小麥煮勿令腹破熟而已曰食三

枕中方治人黃病垂死者服鐵漿一升即愈矣黃疸法

鐵漿
取諸鐵

洗器中
以水浸之
經久色
青沫出
也

葛氏方灸脾俞百壯

穴在第十一椎下兩旁一寸半

又方灸手太陽隨年壯

穴在手小指端

又方灸錢孔百壯

穴度乳至脊中屈筋頸骨是

又方灸胃管百壯

穴在鵠尾脊中已上千金方小品方同之

范汪方灸脊上下兩邊各一寸半二百壯

治黃疸六十壯

僧深方灸第七椎上下

主黃汗

又方屈手大指

灸崑上理各七主

又方灸脊中椎七主

經心方灸兩手心

各七壯

僧深方同之

今案可服可梨勒丸紫雪紅雪芽

治黃汗方第廿六

病源論云黃汗之

名

病身體洪腫發熱汗出不渴狀如風

水汗染衣正黃如麤汁

此由脾胃有熱汗出而

入水中着浴

聖方

九四九

水入汗孔得之

賢門方療黃汗之病狀如風水其

脈沉遲皮膚冷手足微厥面目四肢皮膚皆腫胸中

滿方夕藥八兩桂心三兩黃耆五兩苦酒五合以水七升

煮取三升飲一升心當煩勿堪至六七日即差今葉葛氏方夕藥三兩苦酒升僧深

方苦酒二升治穀疸方第廿病源論云穀疸之狀食畢

眩心忪鬱不安而發黃由失飢大食胃氣衝煙所致心動不安驚也還也

葛氏方治穀疸方茵陳蒿四兩水一斗煮得六升去滓內

大黃二兩艾子二七枚煮取二升分三服三服當去黃汁僧深方

大黃二兩艾子二七枚煮取二升分三服當去黃汁僧深方

治^凡穀疸發寒熱不可食，昂頭眩，心中憊冒，不安，大茵陳湯方。茵陳蒿二兩，黃蘗二兩，大黃一兩，甘草一兩，人參一兩，艾子十四枚，黃連一兩。凡七物切水一斗，煮得三升，分三服。治^凡消疸方第廿八。

病源論云：夫虛勞人若飲酒多，進穀少者，則胃内生熱，因大醉當風入水，則身自發黃，心中懊痛，足脛滿，小便黃，面發赤斑，若下之，久變為黑疸。面目黑，心中如散^{クラフ}蒜廔狀，大便正黑，皮膚^{ヒトノ}之^{アヘモノ}不仁，其脈浮弱，故知之。消疸，心中熱，欲嘔者，當吐之，即愈。其人必小便不利，其後

當心中熱足下熱是其候明也

千金方治飲酒食少飲多澹結菰黃疸心中懊懣オホノ

而不甚熱ル或于臨枳實大黃湯下之方枳實九枚オホノ

大黃二兩豆豉半升支子十枚右四味以水六升

煮取二升分三服今案葛氏方大黃一兩枳實五枚支子七枚豉半升范汪方治飲酒

得黃病方

藥生麥以井華水絞取汁頓服三升先食オホノ

曰三有驗

僧深方治酒疸方

生艾葉一杷ナメミキ

麻黃二兩カイツク

大黃六分

大豆一杷ナメミキ

凡四物清酒三升モトノ煮二升分三服艾葉無生用ナメミキ

干半杷

治女勞疸方第廿九

病源論云女勞疸之狀身目皆黃ナメミキ發熱惡寒少腹滿急小便難由大熱而交接ナメミキ竟入水所致ナメミキ

千金方云黃疸日晡發熱惡寒少腹急體黃顏黑大便溏黑足心熱此為女勞也腹滿者難治モトノ之方消滑石石膏各二味ナメミキ分等治以大麥粥汁服方ナメミキ

寸匕曰三小便極利

則イヌ又今幸葛氏方有消石石小品方有石膏無禁石范注方有禁石無石膏

腎門方療女勞黃穀黃方

苦參四兩

龍膽三兩

文子五兩

檮蒯為散以猪膽汁和如梧子以飲服丸

廿九日三治黑疸方第廿

病源論云黑疸之狀

若

苦小腹滿身體盡黃頤上黑足

下熱大便黑是也夫黃疸須疸女勞疸久々多變成

黑疸

葛氏方治黑疸者多死急治之方

玄根搗絞取汁頓服一升至三時升頃病當隨小便去不

去更服之^レ
今案范汪方云里疽甚
困醫所不治之立愈

醫心方卷第十

醫心方卷十

四

醫心方卷第十背記

本草云橫抑生者極大停刻數人便刻同其中人之腹脹

以上第廿六葉

醫心方卷十

此正源和時書

りては外内と書けり大正源和時書とす

醫心方卷十

醫心方卷第十札記

三頁上

未

梳梳訛

四行

成擇

崇擇怨簿訛謂脫黑子而稱之也

下一行

肥膚

肥即

四頁上

二行注

煨令

煨怨煨

下七

怨忘崇怨

字誤加

五頁上

二行

芳窮分

窮下有脫

六頁下

成少腹

成病源

或

七頁下

甲內

肉訛

十頁上

七味

業方只六味怨脫一味否則六

訛作

十一頁上

八行

若老人

此句巨解

十三頁上

真似

真訛

十四頁上

五行

欲服

仁和尚寺本

下五

小食

仁和尚寺本

五

三頁上

合

訛

下一行

吳菜羹

仁和尚寺本

五

三二

行仁和尚寺本

十六頁上

八行

盡夜

畫訛盡仁

下三

今安

和

醫心方卷第十札記

寺本安 行四 有物 仁和寺本 行五 小于 仁和寺本 七十

頁上 吳菜 更 仁和寺本 行八 暴鬣 仁和寺本 行下 九 餅

疳 仁 和 寺 本 作 齋 店 鳩 酸 草 仁 和 寺 本 鳩 酸 草 蘇 敬 注 云

一 名 鳩 醋 草 掘 此 鳩 酸 草 十八頁 二月 八月 千金作

日 三行 二月 八月 三字 塗 改 作 二 仁 和 寺 本 生 在 仁

寺 本 生 下 五 雜 物 仁 和 寺 本 物 八 豔 癰 仁 和 寺 本

十九頁 一 雙 雙 雙 外 臺 引 集 驗 亦 行 三 飴 之 案 飴

之 俗 字 外 臺 引 集 行 七 一 斗 一 升 作 廣 渚 方 仁 和 寺 本

利 廿 頁 下 鉸 勞 千 金 作 廿 一 頁 癰 結 仁 和 寺 本 此

思米不能飲食久則斃人十三字病源同

行洩便仁和尚寺本洩作洩病源同

廿二頁上四行

草麻

仁和尚寺本作草麻

若病故復不盡

仁和尚寺本作若病故三字外臺引古今錄

驗故上有如字方後云范汪同案文義盡字蓋誤塗

復增十物柳枝

仁和尚寺本作復增十

校外

行開高方

案開高蓋人姓名外臺作開高

行即愈

仁和尚寺本即下有難

字病

下一

友暴

仁和尚寺本作友異病源作妖異

行七斗

外臺引廢濟作七升

下同

半猪

仁和尚寺本同外臺半作羊

行過飢急

仁和尚寺本過作過

行而

圍

外臺圍作圍

行不得

仁和尚寺本得有涓字病源同

上七頁

自果

靈樞

水脹喘

行下

繫瘦

靈樞瘦作瘠

注九行

在脾

案脾字當不疊仁和

寺本脾

廿七頁

大戟分

仁和尚寺本戰下有

上八頁

攬勿

醫心方卷下上已

二

停手

仁和尚寺本攪作攪

行下一

其其根

仁和尚寺本無一其字

世頁下

後

腸滿

仁和尚寺本上有腫字

果水

仁和尚寺本作黑水

世一頁

病源論

云

仁和尚寺本此下有風水病者由脾胃腎虛弱所為也腎勞虛則行出達風氣內入還客於腎世二

字

行七如裹水之狀

仁和尚寺本此下有脈動時欬四字

行下七

菰菜

仁和尚

作奇菰

行八切五升

仁和尚寺本一作一

世二頁遍身

仁和尚寺本遍作

通

行六猪白皮

猪世

行下一汁二升

仁和尚寺本二作三

注四行

去心命熬

仁和尚寺本去令熬三字

世三頁

大麻子

仁和尚寺本作大歷子

行七主之

仁和尚寺本之字不塗

行下一是以

無仁和尚寺本以字

行四日三

仁和尚

作奇菰三

行五炎桃人

仁和尚寺本不塗紫灸恐灸

行六葷麻子

仁和尚寺本

作草歷子案原卷亦作草
歷子後人改作草麻子

八脾虛仁和尚寺本作腎
脾虛弱四字

世五頁上三行
新錄方仁和尚寺本
新作雜

五不伏水土仁和尚寺本
無水字

垂尉仁和尚寺本
作墓下同

下三發熱也仁和尚寺本
發作發

世六頁上八行

十五枚仁和尚寺本
五作二

下五五六十丸仁和尚寺本
丸作兩

六丁

香仁和尚寺本
香作予

七暖水仁和尚寺本
暖作暖

一錢匕仁和尚寺本
匕作上

世七頁上二行注

筋頭骨仁和尚寺本
筋作助案助之訛

九如藥汁仁和尚寺本
九作九

此下有其脈
自沉四字

下一得之仁和尚寺本
成黃汗也五字

四行若須

一升仁和尚寺本
須作酒

世八頁上一行
心中拂冒案原作佛冒後塗
改作冒說見一卷

中下七
藥生麥藥訛

書五方卷上已

三

醫心方卷第十一

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿祢康賴撰

治霍乱方第一

治霍乱心腹痛方第二

治霍乱心腹脹滿方第三

治霍乱心痛方第四

治霍乱下利不止方第五

治霍乱嘔吐不止方第六

治霍乱臨臙方第七

治霍乱于臙方第八

治霍乱煩渴方第九

治霍乱轉筋方第十

治霍乱手足冷方第十一

治霍乱不語方第十二

治霍乱欲死方第十三

治中熱霍乱方第十四

九六六

治欲作霍乱方第十五

治霍乱後煩躁方第十六

治霍乱後食法第十七

治下利方例第十八

治雜利方第十九

治冷利方第二十

治熱利方第二十一

治赤利方第二十二

治血利方第二十三

治赤白利方第二十四

治久赤白利方第二十五

治白滯利方第二十六

治膿血利方第二十七

治水穀利方第二十八

治休息利方第二十九

治泄利方第三十

治重下方第三十一

治痢利方第三十二

治霍亂吐利方第卅三

治不伏水去利方第卅四

治嘔逆吐利方第卅五

治利魚渴方第卅六

治利魚腫方第卅七

治利後虛煩方第卅八

治利後不能食方第卅九

治利後噦方第卅十

治利後逆滿方第卅十一

治利後穀道痛方第卅十二

治霍亂方第一

病源論云霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有

相干オカシ亂之時其亂在於腸胃紅黃多之間者曰遇飲食而

變發則心腹絞痛シヤリル方如二其有先心痛者則先吐先腹痛

者則先下利心腹並痛者吐利俱發挾風而實者
身熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛
而已_二有飲食肉腥_{ナキ}生_{ナレバ}冷_{ヒヤシ}過度_{ヒトクナリ}曰居處不節或
露卧_{ハル}濕地_{ツレ}或當風取涼而風冷之氣歸於三焦
傳於脾胃_ニ得冷_ヲ則不磨_ル則水穀不消化_ル点
令清濁二氣相干腸胃虛弱便致吐利水穀不消
則令心腹脹滿皆成霍亂_二有三名一名胃反言其
胃氣虛逆_ニ反吐飲食也二名霍亂言其病揮霍
之間便致繚亂_也三名嘔言嘔食變逆者也_其蒼生

方云七月食蜜令人暴下發霍亂也

千金方云論曰源夫霍亂之為病也皆因食飲非

開鬼神夫飢食肚膈復食乳酪海陸百品無所不啖

眠卧冷席多飲寒漿胃中諸食結而不銷陰陽

二氣擁而反戾陽氣欲昇陰氣欲降陰陽永障

變成吐利頭痛如破百節如解遍體諸筋皆

為迴轉論時雖小卒病之中最為可畏雖臨

深履危不足以喻之也養生者宜達其指趣庶

可免於交橫者矣極要方云得吐利者名濕霍

乱不吐利者名于霍乱^得多致人往^{トモク}有湿霍

乱不有性命之憂

集驗方云飲而吐利此為霍乱也

葛氏方云凡所以得霍乱者多起於飲食或飽食

生冷物雜以肥鮮酒膾而當風履湿薄衣露坐或

夜卧失覆之所致也治之方初得之便發令温煖

以火炭布其所卧床下大墊減並差被絮若衣絮

自柜冷易墊者又方可燒地令墊水洩數蔣席卧

其上厚覆之又方可作的赤墊湯著中漬足冷

至膝并銅器若凡器盛湯以著腹上衣藉之冷

復易湯又方可以熨斗盛火著腹上而不靜者

便急灸之セウ但明案次第莫為亂灸須有其

病乃隨病灸之霍亂セウ艾丸苦不大壯數苦不多

本方言七壯為可四五壯元不活便火下得眠今案

方九縣霍亂セウ灸之或時雖未
老終无死憂不可不送灸

千金方云凡諸霍亂忌米飲胃得中米即吐不

心但得与厚朴葛根飲今案葛氏方云可送備厚

又云凡霍亂醫所不治方童女月衣合而燒酒服方

寸匕秘方

今案小品方云陽藥條周
通不著服之立愈

范汪方治霍亂吐下不止理中湯方人參干

薑白朮甘草各一兩水三升者得一升半分二服今案小品方藥各

三兩水六升煮取三升分三服醫門方白朮三兩人參三兩甘草二兩干薑二兩水七升煮取二升半若胃滿腹痛吐下者加當歸厚朴各二兩若悸者寒者渴者並主之

錄驗方治霍亂虛冷吐逆下利理中丸方

人參甘草各二兩干薑白朮各二兩凡四物搗下蜜丸如

彈丸取一丸內煖酒中服之日三今案本草救急

又方單煮厚朴飲三升有効

如梧子得十六分丸如彈丸一枚分

又方煮梨葉服之今案醫門方云取梨枝葉一大握以水二升煮取升頓服立差

効驗方治霍乱吐下利理中散方 甘草二兩炙 人參カニクモ

二兩干薑二兩 朮二兩フナヲ

凡四物治節酒服方寸匕日三名

小品方扶老理中湯治羸ルイ老冷氣惡コノルイ心食飲不

化腹虛滿物急短氣及霍乱シ欬逆四支冷心七五

煩滿氣閉流汗患主之 人參五兩干薑六兩ナシ

朮五兩ナシ麥門冬六兩附子三兩ナシ伏苓三兩甘草五兩

凡七物下節節作散臨病者三合白湯和方寸

聖方集卷一

五

ト一服不効セシ又服常將者蜜九酒服如梧子廿九モトモ

又云霍乱吐下汗出矣冷轉筋飲達煩悶欲得シ

冷水者方可与厚朴葛飲進沾喉中而已慎勿ホカクハク根

与米飲及粥但与此單行飲以代米飲水漿ホカクハク根

水也又方取霍香一朶以水四升煮取一升頓服トコロ

愈イエ今案本草云一朶トコロ又方煮青木香汁飲至佳又云治トコロ

卒道中得霍乱无有方藥危急方ナルヲ蘆蓬アシララ

肯大枳煮令味濃頓服二升即差有効イエ

醫門方治霍乱吐下不止者方煮百沸湯細

添生水アツク熱飲之アツク今素問繁論云熱水一升又方或煮

高良薑カネミ或煮水カネミ汁飲之カネミ通玄經云治霍

乱方木瓜モト煮作飲服之モト今素本草モト陶注云モト若子并校煮飲又

救急單驗方療霍乱方桂三兩煮汁取一盞

頃セウ服驗セウ陶景本草注云霍乱吐下方セウ楠材セウ削

作楠煮服之治霍乱心腹痛方第二病源論

云霍乱而心腹痛者是風冷之氣容於府藏之

間冷氣相擊トキ或上攻心トキ或下攻腹故心腹痛也葛氏

方治霍乱若腹痛急似中惡者方

禱生昌蒲根飲汁少シモハ多ク令下咽イエ又即老又云卒得霍

乱先腹痛者方灸齊上一夫十四壯名大倉若繞脊痛

者灸齊下三寸四壯名關元今案千金方云一夫者以四指為一手夫即當大倉穴樣要方療

霍乱心腹激痛方當歸三兩桂心三兩干薑三兩甘草

一兩右以水七升煮取二升分三服小品方治心腹暴

痛及宿食不消或宿冷煩滿成霍乱方作塩湯三升

使極臙ヒカラ熱飲一二升刺吐令宿食盡不吐復服吐訖

使極臙ヒカラ熱飲一二升復飲三吐乃佳須靜乃上膝諸湯

九今案廣濟方塩一升水三升煮取一升三合溫服八合又云霍乱腹痛吐下方

刺生以栢
刺腹也

田四字注

續より

セウ

ヲ

イヌ

コク

ホ

取桃菜冬田四字注天用皮按取汁一服一杯立愈イヌ点可濃煮コク

飲三升者婆方治霍乱先腹痛方煮生薑イヌ炙飲之コク

又方厚朴汁飲之僧深方治霍乱腹痛而煩方

高良薑四兩以水五升煮取二升分二服カハネクモ蘘敬本カハネクモ

草注霍乱絞痛方粟米泔汁飲數升立差アハハシカアラハトヤハハシカアラハトコクトコロイエヌ

廣洛方療霍乱心腹痛煩ムカハク臨不心方厚朴四兩カハネクモ

橘皮二兩人參二兩カハネクモ當歸二兩ヤハハシカアラハト霍香一兩高良薑カハネクモ

四兩切以水七升煮取二升五合分温三服セウ忌生冷イヌナハハシカアラハト

粘食通玄方治霍乱先腹痛方好驗トキ酢細飲イヌ

醫心方卷十一

二

一盞許分リ又方肉火炙腹モ及背得汗アツシ即愈アセアユル

治霍乱心腹胀脹滿方第三 病源論云霍乱而心腹

脹滿者是寒氣与藏氣相搏つ真耶相攻不得吐利

故令心腹脹滿んナリ

葛氏方治霍乱心腹胀ハナリ痛煩滿短氣未得吐下方

生薑若干薑一二升以水五六升煮三沸モシハ頃服若不即

愈更イエ可作ツル又云治若煩悶湊滿者方又方桂屑半升以煖飲和之盡服

灸心下三寸七壮名上管又方以塩内脐中灸上二七セヨ

壮又云治煩嘔腹胀厚朴湯方厚朴四兩桂二兩枳カラ至

實ア五枚生薑三兩以水六升ル煮取二升ル分三服

者ハ婆方治霍乱煩悶ル湊滿方厚朴二兩ル以水三升ル

煮取一升半ル分三服老人小兒モ旦佳范汪方治霍

乱腹中脹滿ル惡毒悶絕不通氣ル息急危方生薑二

累クナシ支子十四枚桂心一兩香豉クナシ五合四物クナシ鳩以酒二升ル解之

去滓ル煩服ル今案錄驗方生薑累數ル以其一文ル莢累取ル服肥大ル

者ハ本草干薑一累者ル以一兩為ル正千金方ル以半兩ル

為ル小品治方霍乱腹痛ル脹滿短氣不得吐下ル多不効ル

者ハ契伏心藏中煩悶ル鬱ル者方ル可取白粉水ル和如糜汁ル

傾之頓飲一升許即吐者便愈不吐者刺吐之永不吐者

皆危也クタイアハクキシ无粉者折シ棘米取汁シ僧深方治霍乱腹脹

滿不得吐方梁米アハクハルシ粉シ五合以水一升半和如粥シ頓服セシ須臾

吐若不吐難治

痛端目録作痛字

治霍乱心煩方第四

病源論云霍乱而心煩者由大吐大利府藏氣暴極

故心煩必有未經吐利而煩者是冷氣入於腸胃

遂上故名煩

醫門方療霍乱心煩方

香豉七合綿裹

支子人三兩クキタシ厚朴三兩炙

水五升モ煮取二升去滓分溫三服重者不過再必愈モ

通玄經云霍亂心煩悶不已方

用粟米汁飲之半升即愈アハツルミチニウマ

又方可服粟米粉和水服一合立愈アハツルミチニウマ

又古霍亂吐下已止發熱心煩欲飲水方

可与少秫米ルミキウ アハツミチ粳汁シ佳若不止可与葛根ゲコン著蔗飲也セキヤ

治霍亂下利ルミコト不止方第五

病源論云霍亂而下利不止者是腸胃俱冷而換宿虛

穀氣不消故也

小品方治霍乱洞下腹痛方

以艾一把以水三升煮得一升頓服之良

又玄霍乱卒吐下不禁者人參湯主之方

人參二兩 伏苓二兩 葛根二兩 橘皮二兩

麥門冬二兩 甘草二兩

凡六物以水五升煮取二升分三服

葛氏方治霍乱下利不止者方

灸足大指本節內一寸側白完際左右各七壯名大都

又玄霍乱吐下不止方于薑菜黃各一兩水二升者取一升一服

又玄灸兩乳邊里外近腋白完際各七壯

今案治霍亂吐利理中湯理中丸主之在上條

又玄先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯

又玄吐而下不止者灸臍下一夫約中七壯

治霍亂嘔吐不心方第六

病源論云霍亂而嘔吐者冷氣入於胃氣變亂冷耶
既戒穀氣不和胃氣逆上故嘔吐也

葛氏方治霍亂嘔吐不心方

生薑五兩水五升煮取二升半分三服

僧深方治霍乱煩痛臨吐不止并轉筋方

生香薷一朶桂心二兩生薑三兩三物以水七升煮取

藥一斗

せう

升分二服甚良

又云霍乱臨吐水藥不下茱萸湯方

もうがい

モ

ア

茱萸一升黃連二兩附子一兩甘草一兩生薑三兩

カクアケ

クシフヘイカア

凡五物以水七升煮取三升分三服

せう

小品方治霍乱欬吐及暴下方

ホクシヤ

カフニホクシヤ

アリシヤ

半夏三兩干薑四兩人參三兩桔梗三兩附子四兩

ル

ル

凡五物下篩臨病和之若吐下不止者以苦酒和之飲

服二九如梧子大セウ
ハカリ
オホキセ

范汪方治霍乱欬吐附子湯方

大附子一枚甘草六銖蜀椒二百粒セヘカミ三物水三升煮取

一升半分再服

治霍乱オホキセ臨臈方第七セウ

病源論云霍乱而臨臈者セウ由吐利後胃虚而逆則臨臈オホキセ達

遇冷析之氣不通則臈之セウ

范汪方治霍乱臨臈氣厥不得息方セウ

香豉タケ一升半ホソク复一兩甘草一兩生薑二兩

人衆一兩カラニホ苡胡一兩フセリ六物以水五升煮取二升半

服七合日三セウ
フセリ

又方半夏二兩生薑二五兩水三升煮得二升合

再服

葛氏方霍乱若脱者セウリル

灸手腕第一约理中七壮名心主當中指也セウリル

小品方治霍乱歇蹠吐逆良久不心方

灸巨闕並大倉各五十壮今案巨闕穴在去鳩尾骨端一寸大倉者中管穴在上管下一寸

治霍乱于臨方第八オノミル

病源論云霍亂而于嘔者吐下後脾胃虛冷三焦不
理氣オキヲ不結於心下氣時逆上故干嘔ル者オキル謂イフ欲嘔ムカフ
而无所出也

小品方治霍亂或引飲輒干飲方

生薑五兩以水五升煮令得二升半久再服良

又云治干飲オキシ逆サカシ為辛足厥冷橘皮湯方

橘皮四兩 生薑半斤

凡二物以水七升煮取三升一服セツ

一升湯下咽即愈イタ

葛氏方霍乱干瀉者方フクセツル

灸手腕後三指大兩筋間左右各七壯名間使タタキ

又方取薤一席口以水二升煮令得一升半服之オホアラ一握也

不過三作アタヒツク

治霍乱煩渴方第九

病源論云霍乱煩渴者大利津液竭則則藏燥カク

則渴也煩渴不止則引飲引則利止止則利止止

葛氏方治霍乱吐下後大渴多飲則斂人方

可以黃稟米五升水一斗煮之得三升斗

澄シメス稍シ飲ツ之勿レ飲ツ餘飲ツ之

腎門方霍乱熱心煩渴者方

以糯米水漬モチヲヨネ研ヒキ之以冷熱水混取米泔汁ヨミ意飲ホシアル之即定ル搔カ効

僧深方霍乱吐後煩而渴方

紫蘘子イヌエウア一升水五升煮取二升分二服セリ无子取生蘘

一把水四升煮一升半分二服セリ

小品方治霍乱煩渴者方

粳米汁フルキチネウ飲數升立トコ差イヌエ

又方取新汲冷水飲之

集驗方云治霍亂而渴者理中湯主之

治霍亂轉筋方第十

病源論云霍亂而轉筋者由冷氣人於筋故也

葛氏方霍亂轉筋者方

灸臍心下五六壯名涌泉

又方灸大指上凡甲際七壯

又方苦酒和粉塗痛上

又云轉筋入腹痛者方

令四人捉手足灸脊左一寸十四壯

又云若轉筋入腹中如欲轉者方

燒編アユ蘆コモ索スナ三指撮酒服之

又方釜底黑末酒服之

又云腹中已轉勸者方

當倒檐病人頭在下勿使及地腹中平乃心

又云若兩臂脚及胷脅轉勸者方

取塩一升半水一斗者令ヒタセ熨漬手足在胷脅者湯洗

之轉勸入腹中若刺者引陰縮必死猶在倒檐

之可糞也

千金方霍乱轉筋方

藜一把七ヶ去兩頭水二升煮取一升頓服之

又方內塩イシ音中灸二七壯并治腹脹シモ

又方以車轂クルマカサ中ツツ晒塗足心下

又方灸足趺取筋上白宛際七壯立愈又
又方灸少腹横骨中随年為數セウ

又云轉筋在兩臂及肘中方

灸手掌白宛際七壯又灸臑中チウ府巨闕胃管

小品治霍乱轉筋方方

以苦酒煮布裹漬之（亂）青冷復易（音）又方可以白截瘡（截）假更及

粉及熱洗之（カ）ラ（下）ア（上）

又作踏使合及

本書誤字
玉酢并但敷及茶也

龍門方治霍亂轉筋方

取木瓜子根莖煮湯服驗（ア）ネ（ク）キ（セ）ラ

醫門方治霍亂轉筋方

取熱燂灰以驗醋和令夜溫炒令極熱（ア）ヒ（セ）ト（キ）以青布裹（イ）リ（ハ）

及熱熨筋上（オ）カ（ラ）（フ）セ冷易之隨手消散也（ヒ）タ（カ）ラ（ウ）

又云霍亂遍身轉筋入腹不可奈何方（イ）カ（ホ）モ（ル）

多作塩湯内（コ）ム（ラ）カ（リ）舂槽中令溫暖（オ）ラ（フ）ネ（昨）漬之佳小品方（ヒ）ラ（セ）

云大驗

槿要方霍乱轉筋方凡

生薑一升 右水七升煮取二升分三服

刪繁論霍乱轉筋方凡

取絮巾モシハ若綿灸アヲアサシ暖ユル以傳筋上ツル今案范汪方轉筋在脚纏脚入腹脰腹厚溫煖ヒヤ已向大也大カ

范汪方治霍乱轉筋方

甕壤土水ネルツマツ和塗其上ス愈又方取凡藶一名苦酒合凡粉凡小溫之凡塗于麻之凡

廣利方治霍乱轉筋入腹方

取塩三合以水五升煮取三升以青布浸湯中用拭轉

勸上

陶景本草注云治霍乱轉筋者

但呼木依名及書上作木依字皆全愈

治霍乱手足冷方第士

病源論云霍乱大吐下其腸胃俱虛乃至汗出其脉欲

絕手足皆冷名爲四逆者謂陰陽卒厥絕也

葛氏方先手足逆冷者方灸足內踝上一夫兩足各七壯

又云治下不止手足逆冷方

栝百枚附子一枚水三升煮取一升二服

醫門方霍乱吐利不止心煩四支逆冷方

厚朴甘草人參白朮各二兩生薑三兩以水六升煮取三升服之

小品方霍乱多寒手足寒厥脉绝茱萸四逆湯主之方

吳茱萸二升當歸三兩芍藥二兩桂心四兩細辛二兩

生薑半斤通草二兩甘草二兩

凡八物以水四升清酒四升合煮取三升分四服

錄驗方霍乱吐下而汗出小便復利或下利清穀裏急

勢脉微欲絕或惡寒四支拘急手足厥逆四逆湯主之方

人參三兩干薑三兩附子二兩甘草三兩

凡四物以水六升煮取二升半分三服轉筋定_{モリカハル}汗_{ヒタ}

出欬_{モク}喘者良。小品方同之。

治霍乱不語方第十二_{モクハ}

葛氏方治霍乱欲死不能語方_ル

生薑一斤切水七升煮取二升分三服

又方飲竹瀝少許又方蘆蓬_ル苒_ル大把濃飲_{ヲ煮}二升

即差_{イエス}又方干薑三兩甘草一兩附子一兩水三升煮取_ヲ二升

分三服

治霍乱欲死方第十三

醫門方霍乱吐利不止心煩四支逆冷方

厚朴甘草人參カウネキ白朮各二兩生薑三兩以水六升煮取三升分服

小品方霍乱多寒手足寒厥脉绝茱萸四逆湯主之方

吳茱萸二升カウハシカア當歸三升ヤトセリ芍藥二兩桂心四兩細辛二兩アヲウネクセ

生薑半斤ワシウハシカア通草二兩ツナカウ甘草二兩

凡八物以水四升清酒四升合煮取三升分四服

錄驗方霍乱吐下而汗出小便復利或下利清穀裏外

契脉微欲絕或惡寒四支拘急手足厥逆四逆湯主之方

人參三兩カフニケ干薑三兩附子二兩甘草三兩

凡四物以水六升煮取二升半分三服轉筋完_{モウカレハ}止_ト

出飲_{モウカレハ}者良。小品方同之

治霍乱不語方第十二

葛氏方治霍乱欲死不能語方

生薑一斤切水七升煮取二升分三服

又方飲竹瀝少許又方蘆蓬_{イヌハ}苒苒大把濃飲_{ヲ煮又}二升

即差_{イヌハ}又方干薑三兩甘草一兩附子一兩水三升煮取二升

分三服

治霍乱欲死方第十三

病源論云霍乱而欲死者由飲食不消冷氣内搏或来

得吐利或雅吐利冷氣未歇致真耶相干陰陽交爭

氣厥不理則煩悶^{トキニハラセテラ}逆滿^逆回^回之故欲死

提要方療霍乱臨而煩悶^{シテハナト}脹喘垂死^ニ經日不解方

厚朴四兩桂心四兩枳實^{カラカキヲミ}三兩生薑十兩以水八

升煮取三升分三服

葛氏方治霍乱^{ルモル}衆治不^ル老煩躁欲死^{ハナシ}脹氣急方

燒童女月經衣^{ヤシ}而^ニ未^レ以酒服^{セシ}少^シ豆豉^{トコロイユエ}

又云治霍乱^ル神秘起死^{シスル}灸法

以物橫度病人口中屈之從心鳩尾度以下各度

下頭五壯橫度左右復各五壯此處先灸中央

每月中廉月也名鳩尾骨也

又方灸脊上以物圍令正心厭又夾脊左右一寸

各七壯是腹背各灸三處也

又云華他治霍亂已死上屋喚魄者諸治皆至而猶不

差者方

捧病人覆卧之申臂對以繩度兩肘頭依繩下

夾背脊大骨中去脊各一寸灸之百壯无不活

者已試數百人皆即。

越坐他以此術傳其子度世秘不傳也

又云浮利不心而轉輸入腹欲死方

生薑三累柏破以酒升半煮三四沸頓服之

治中熱霍亂方第十四

小品方治中熱暴下利霍亂變熱心煩脈數者方

飲新出井水一升立愈飲多益善此治是胃中

多熱者也无熱者慎之不可与也

又云齋岸湯治先有石熱因霍亂吐下服諸熱藥

吐下得止目空虛仍變煩手足熱口燥欲得水飲達迷

悶脉急數者及時行藥病後毒未盡曰霍乱吐下仍

發熱煩悶^{ハルカマツル}心欲破^{ハルカマツル}裂者方

藜蘆^{セキクセナ}二兩 人參^{カフニクセ}二兩 厚朴^{コウハク}二兩 知母^{チモ}二兩 栝樓^{カフハクリ}二兩

葛根^{クワケン}二兩 枳實^{カウタチヤク}二兩 犀屑^{セイセツ}二兩 藍子^{ランシ}谷 桔梗^{キョウキョウ}二兩

橘皮^{キヒ}二兩 伏苓^{フツレイ}二兩 黃苓^{ワウレイ}二兩 甘草^{カンサウ}二兩

凡十四物以水八升煮取三升分五服

治欲作霍乱方第十五

耆婆方治人腹脹欲作霍乱方

厚朴^{コウハク}二兩 以水三升煮取一升半分三服即差

最善老人三佳復秋月恒量此藥在家有急即煮

服

醫門方療心腹脹滿堅痛煩悶不安雖未吐下欲霍亂方

取塩五合水二升煮令消煩服之當吐食出即定如不吐

更宜服

今案葛氏方塩二升以水五升煮取二升煩服

葛氏方治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方

生薑若干薑一二升以水五六升煮三沸煩服

小品方治霍亂煩擾未得吐下方

煮香薷汁飲之

今案葛氏方去取藜若香薷細切二升水五煮再三沸煩服

治霍乱後煩躁方第十六

病源論云霍乱之後而煩躁卧不安者由吐下後府

藏虚極陰未理陽血虚氣乱タニナラ血氣之行未復タニナラ常度内棄

於府藏故煩躁不安卧也

葛氏方治霍乱後煩躁卧不安方

葱キツネ白シロ廿枚大棗オウゴン廿枚水二升煮取一升頓服之

治霍乱後食法第十七

醫門方云若霍乱吐利定後胃氣虚弱不可強食

便更作病ナ俟待須食仍ヤシヤク与稀飲勿令至飽其飲

宜炒粟米煮之為佳

千金方云凡此病定已一日不食為佳仍須三日少

与粥三日已後乃恣意食息也仍七日勿雜食為佳

又三諸霍乱忌米飲胃中得米即吐不止但得与厚朴葛根飲

治下利方例第十八

千金方云論曰凡利有四種論冷熱甘盪冷則白熱則

赤甘則赤白而雜盪則純痰而熱則多益黃連去其干

薑冷則加其熱藥甘則以藥吹灌下部盪則以盪

法治之

又云古今利方千万不可具載此中但揅其効者七

八而已ヒロル然弘之在人也何則九八陟アツク厘リ丸各配烏梅丸ホシクハ松皮散

等暴利セハ服之何有不差其溫脾湯建脾丸久下得之俗用建脾丸

焉能不愈也イカク

醫門方云辨コソコロ見下利者九八因多觸三熱飲水或夜露坐アラハ

卧冒霜雪風寒耶氣客於皮膚流傳入於藏府隨其ニ

冷熱腹胃不調トウホラ或因食肥膩ニ而生或因食冷熱ニ而發ニ

生於風而復生ホル泄者未詳其理文

又云下利欲飲者ホル為有熱利而不渴其藏有寒下アリ

利後更煩オカ按其心下軟者ヤカラ為虛煩也九八

里一〇一

二二

謹
誠又作

又云下利有不欲食者有宿食ル宜下ヘ下利寒時イ

復發此病不盡ヘ宜下ヘ下利腹滿不減トモ不足言ル當下ヘ

利而識語タラシ必有燥屎カレシ當下利ル脈遲滑實者為未ル

止ヤ宜下イ下利脈數而滑者有宿食急下ク腹痛而利ル

但當溫之アタタカ

又云下利甚者手足痺不仁下利而反發熱身形シキモスハ

汗出者自愈イユ下利脈數而渴欲飲自愈下利熱汗出イユ

者自愈

又云下利手足无脈多之不溫アツシモ發喘者死ル下利後脈絕又

手足厥冷平時脉還手足溫者生脉不還手足冷

者死又云久下利或熱或寒暴下兩日即有膿血口唇生

瘡口中舌上屑並生瘡如粟瘡裂者心中懊悶唾

血此為虫在上食人五藏下脣内生瘡者食人下部

欲卧宜以斂虫藥療之

葛氏方云下利手足逆冷灸之不暖或无脉微喘者死下

利舌萎煩躁而不渴者死下利不禁腸垢出者死今案

下利人可食物

赤小豆

孟詵云止痢

小麦

本草云止利

青梁米

本草云止洩利

黃梁米

要方心方卷二十一

二二二

本草云 上洩 丹黍米 本草云 上洩 粳米 本草云 上洩 橘 本草云 上洩 柚 本草云

梅 本草云 上洩 柿 本草陶注云 火薰者性熱新下 石榴 本草云 上洩 通草 本草云 赤白下利

橡實 本草云 主下利 雉 本草云 上洩 雲雀 本草云 赤白下利 鶉 本草云 利人可和

生薑黃食雀禹 鴈 雀禹云主 赤白下利 鵝 雀禹云主 赤白下利 鴈 雀禹云主 赤白下利

鮎魚 雀禹云主 赤白下利 鰓 雀禹云主 赤白下利 鰓 雀禹云主 赤白下利 鰓 雀禹云主 赤白下利

海鼈 雀禹云主 赤白下利 小羸 雀禹云主 赤白下利 董藻 雀禹云 上冷利

蜀枲 本草云 除下利 下利人可忌物

千金方云 九利病通忌生冷酢滑猪雞魚油乳酪麋

乾脯醬粉醢所食諸食皆大須就爛為佳亦不得傷

飽此將息之大經也

凡ルイカムト

養生要集云腹中有冷患飲乳汁令腹痛泄利食

定寒

經云杏人不可多食令人熱利

カラモフセネ

三セ

治雜利方第十九

病源論云雜利ト云イフ謂利色無定セタ或承穀或膿或血或青或

黃或赤或白ト云變雜サシ无常或雜色相兼而利也凡ラフ挾

熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青

ニキトキハ

黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故易變

ニ

シ

小品方治雜下方第一下赤二下白三下黃四下青

五下黑六固病^ヤ下^ル如瘵赤^ル五七久下八下不可止

九連^{三チ}年下十卒下十一下少^ル而數十二霍乱而下十三

下如捨水^ル十四下已^{オハリ}則煩十五息下一作^{ヒトタモハ}一止十六而不

欲食十七食无^无數但^タ下者十八下但欲飲水十九重

下廿下雜錯不可^{オモ}詔字合廿種下江夏大守以此

法治^ル是下盡愈方

黃連^{カクテクモ}一兩 黃蘗^{キハク}一兩 乾艾^{ヤイモ}一兩 附子^{アヲシ}一兩 甘草^{イリク}一兩

干薑^{ホシタ}二兩 烏梅^{ホシタ}廿枚^{布菱及}去核取^{七ヶ七ネ}完熬^イ之

凡七物合^{ホシタ}鴉下^モ後蜜和^{ハカリ}丸如大豆飲^{セウ}服十九漸^{セウ}

至廿九日三

今案葛氏方云治千万種雜下集驗方
另為梅丸一醫門方治一切利无不奏云

范汪方烏梅丸治万種下利方

干薑黃連蘗

カクテキキ分

黃芩

ヒミキ

艾各二兩

烏梅ホシクメ

廿枚

取トシ

四ツ

右六物丸

ハカリ

如梧子服十九日

名

三老少半良驗

又云治下利日百行師所不治方

モタヒナイモ

麴朮カクテ

一セ

方寸匕

日

三以食

ニ

愈為度

當以粟米粥

アハルシテカ

服之

令李方治下利一日百起

モタヒナク

黃連散方

黃連二兩

カクテ

甘草二兩

凡二物

治節酒

腹方寸匕

ツ

日三立愈

樵要方療冷熱不調或滯或水或五色血者方

醋石榴ヒツロ五枚合サカラカス穀子イッキ搗絞取二升汁服シヤリ五合

廣濟方療百千種雜痢黃連湯方

黃連カク一兩テク干薑カク一兩テク熟艾ヤイ一兩モ附子ヤイ一枚モ蜀椒フセ

阿膠カク
出東阿カク名之

十四粒カク阿膠カク如手大カク切セ以水五升カク煮取二升カク五合カク絞カク去滓カク內膠カク更上火カク煎膠カク烱カク久温カク三服カク忌生カク豬肉カク

魚蒜カク

傳信方云一切痢神効方カク

黃連二兩半キハク黃蘗一兩半カマコウワ零羊角半兩アツホト伏苓半兩

石田味為散蜜和丸用薑蜜湯下ククセ

灸諸利方

經心方云灸脊中稍至二三百壯又灸關元三百壯

并治冷腹痛フエ開元香下三寸是也

新錄方云灸脊中十三百壯セウ從大椎度至窮骨中折則是也

又方灸脾俞百壯第十一椎兩旁名脾俞

又方灸腸俞百壯第十六椎兩旁名大腸俞

今案石論云金液丹十種水穀赤白等利此丹皆治瘕

治冷利方第廿

病源論云腸胃虛弱受於寒氣腸胃虛則泄故
為冷利也凡利色青白黑皆為冷也色黃赤是熱
也故利色白食不消謂之寒中也

千金方驛車丸主大冷洞利腸滑下赤白如臭腦
日夜无節度一

腹痛方

黃連カキク六兩 干薑三兩 當歸オウゴン三兩 阿膠オウゴン三兩 四味以

大酢五合 洋膠和之併手丸如大豆服之大人服卅

丸小兒^ハ百日以還^{コウカク}三丸暮歲者五丸^日四五服

葛氏方下色白食不消者為寒^ル下方

干薑赤石脂^{コブツ}各等末白飲和丸如梧子^分曰十九日

未差精也

三夜一

又方酸石榴皮燒末服方寸匕

又方生薑汁^シ二升蜜合煎取二升頓服^チ

又方豉^シ一升薤白^{オホアラフネ}一朶水三升者取二升及漿頓服^チ

有^{ルモ}太棗肉七枚良^{ナツメ}

又云有^{ヤムルツル}心患^タ冷者淳下白如鼻涕^{ハナナリ}治之方

又云有^{ヤムルツル}心患^タ冷者淳下白如鼻涕^{ハナナリ}治之方

二二五

龍骨ワウホネ 干薑附子カウホネ 等イ 搗蜜丸ミツ 服如梧子カ 五丸ハカリ

至十九日三

范汪方治寒冷下利方

干薑四兩カウホネ 人參三兩カウホネ 桔梗四兩アサヒ 附子四枚セウ 炮ホウ 半ハカリ

復三兩洗 凡五物アラハ 下セウ 節和丸ハカリ 平旦服五丸如梧ハカリ

子日再漸フタヒ 加五物カウ 勿ハカリ 熱食

又玄四順湯ニ 治ル 逆順寒冷ニ 飲食不調下利ハカリ 方

甘草三兩カウホネ 人參二兩カウホネ 當歸二兩ヤセ 附子一兩ハカリ 干薑

三兩 凡五物水七升ハカリ 煮取二升半ハカリ 分三服ハカリ 今案ハカリ 僧

深方加龍骨二兩

又云四逆湯治下利清穀身反惡寒手足逆冷此為

四逆之湯主之相視病人与方相應便与之方

甘草二兩附子一枚干薑一兩半

凡三物以水三升煮取一升二合分二服

小品方黃連湯治春月暴熱解脫飲冷或眠湿地

中冷腹痛下青黃汁疲極欲死方

黃連四兩カクテラフ當歸三兩ヤナセ干薑三兩厚朴二兩

凡四物切以水七升煮取三升分三服今案經方无厚朴有石栝皮

秘迹方温中湯治寒下飯臭出方

甘草一兩

炙

干薑半兩

蜀椒八十枚

去目者

附子二枚

四破

毛

凡四物以水二升煮取一升分再服若飯內橘皮

半兩老少者皆取服良

廣濟方療冷痢青白色腹內常鳴行數踈出即

大多調中散方

龍骨一兩

炙

人參一兩

炙

黃連一兩

炙

阿膠一兩

炙

黃蘗一兩

炙

黃蘗一兩

炙

黃蘗一兩

炙

黃蘗一兩

炙

黃蘗一兩

炙

黃蘗一兩

兩搏師為散煮米飲服忌猪魚蒜炙肉粘食等

集驗方治久新寒冷下利腹內不安食輒注下令人

生肉烏梅丸方

烏梅ハシメ三百六十枚

去核煨ヒキ熟リ令可搗ミ

附子ハクシ四两

乾薑カンキョウ連カキ

十二两

乾薑乾シテハカク曰ク方

凡曰物搗下篩分蜜丸飲服如梧子十九日タモ再タモ方

治契利方第廿

病源論云腸胃虛弱風邪カハヒキニハ使契乘之サシ腸虛則泄トキニハ故モラ

為契利也其色黃キナカ若契甚黃而赤也

錄驗方青要結腸丸治契毒下不絕ニ不問久新悉治

之方

若參橘皮阿膠カクブシ獨活カクタク夕藥エヒスクスリ黃連カクダモノ藍青二

方干薑四曰四分代兎曰又カクダ黃蘗キハク甘草各四分九十物

合搗下篩蜜烱トイ膠和之アセ餅ヒネリ作丸分リ如梧子干ホシ

以飲服十九日三不イモ和イモ稍セ增ホ同ホ

梧

不和イモ稍セ增ホ同ホ

經心方烏梅湯治熱毒下有濕方甘果

黃連カクダモノ二兩烏梅ホシ甘果カクハ阿膠カクハ一兩カクハ支子タチ并タチ枚タチ黃蘗キハク兩

布麦及

五味以水五升煮取二升半分再服

新録方治熱利者方

干桑叶水三升煮取一升頓服

又方豉二升水三升煮取一升半二服

耆婆方黃連丸治中熱下利方

黃連十二分干薑八分當歸八分右三物鴿酥蜜

和丸如梧子服二丸不知加之

葛氏方下色黃者協毒熱下也治之方

支子十四枚去皮搗蜜丸如梧子服三九日三

又挾熱者多下赤膿或難血治之方

薑連竈竈中塵末酒服二方寸匕日三

又方薤一把握オホアラ煮フナ真レ鮮レ內フクモチ林米食之多久イヌ差

千金方治五利レ熱シモト諸治不差方

烏梅ホクニ實ニ一升カクイニ熬イ黃連一升カクイニ金色者二味モ蜜和分カ梧子

服ウ廿九日三夜一神良 僧深方同之

廣濟方療熱毒痢甚數出不多オ腹中刺セカク痛方

生犀角末三兩セクロウカハ酸石榴皮三兩セクロウカハ熬イ枳殼カクイニ三兩セクロウカハ蜜イ

搗為散飲服兩方寸匕日再忌ヌ熱食

治赤利方第廿二

病源論云腸胃虛弱為風耶ルトスハヤフラ所傷則挾イ熱乘於

血色澤流入腹と利相雜下故為赤利

腎門方療赤利腹中絞痛下部疼重方

黃連カクシク當歸ヤナセリ黃蘗キハク乾薑シラカ各二兩石檮シラカ篩為散者ホタレ

烏梅シラシ汁服方寸匕日二

如意方治下赤利術

金色黃連カクシク一升去毛黃蘗キハク一升去毛犀角二兩九三物

切以水五升煮取三升去滓內白蜜一升又煎三升

平旦服至日中令盡勿間食也

救急單驗方治赤利方

黃連カクテシモ三兩 黃蘗キタ三兩 炙子人クナノ人ノモネ二兩 凡三物以物以シキナク

水九升煮取三升分三服セヨ

又方搗黃連カクテシモ末和水服一匙ヒトカヒ以麝為度

治血利方第廿三

病源論云血利者熱毒折於血入大腸故也身熱者死キタ身寒則生イタク

千金方治大熱毒純血利シトモ治不可老者方

黃連六兩 一味水以七升煮取二升半夜露暑アラシオチチ

日星下且空腹煩脹之卧息即止ヤヤク

槎要方療血痢方

真生犀角末五兩

阿膠カヌ四兩

干薑カニ三兩

艾葉カニ

三兩カニ

黃蘗キハタ四兩

右五物搗篩為散服方寸匕

廣利方理血痢方

酸石榴セクロ一顆

和皮カニ

搗取汁カニ

蜜一大匙カニ

和煖カニ

頓服之カニ

治赤白利方第廿四

兩禁及下瀉

病源論云其利而赤白者カニ是契乘於血

濕腸カニ內則

赤也カニ

氣入間カニ

搏カニ

腸間カニ

津液滯カニ

則白也カニ

冷カニ

熱相交也則

赤白相カニ

雜カニ

重者狀如膿カニ

涕而血カニ

雜之輕者

面膿上カニ

有赤脉薄血状如巢之世謂之巢臍利也

本草經治赤白利方卿臍作鱸食之

錄驗方鵝蜜丸治赤白利方

朴消二兩ヒラキ黃芩一兩ヒラキ大黃一兩オホ代甘草一兩オホ黃連二兩

豉一兩シキ鵝巴豆ヒラキ一分ヒラキ石七物丸ヒラキ如梧子ヒラキ空腹服三丸

出已郡似金豆名并

日三

又云赤白痢赤多熨方

犀角六分

犀角

黃芩六分

ヒラキ

地榆六分

ヒラキ

黃連八分

ヒラキ

甘草四分

炙

切以水二大升煎取八合去滓ヒラキ空腹分三服

千金方治赤白利黃連湯方

黃連三兩 甘草一兩 當歸二兩 黃蘗三兩 干薑

二兩 石榴皮三兩 阿膠三兩 七味水七升者取三升

分二服

集驗方治暴下赤白方

香豉一升是義父 薤白一朶オホミラフネ

凡二物以水三升者取三升 頓服之今檢本草

云草一朶者重
二兩為心

傳信方療赤白痢如鵝鴨肝方

黃連オホミラフネ 各八分 石二味以水二升煎取一升

分二服

廣利方治赤白痢^リ白^ク多^ク冷痛方

黃連八分^{ヤナギ}厚朴五分^{ヤナギ}炙當歸四分^{ヤナギ}伏苓六分^{ヤナギ}乾薑

薑三分切以水一大升七合煎取七合者^去滓空腹

分兩服^{イメサメニテシク}忌猪肉生冷^{キカナルモノ}

又云赤白痢赤多熱方

犀角六分^屑黃芩六分^屑地榆六分^屑黃連八分

甘草四分^{炙切}以水二大升煎取八合去滓空腹分服

醫門方療赤白利腹中絞痛^イ无問遠近方

黃連八分五色龍骨十分黃芩六分石菖散以清

飲空腹服方寸匕

崔禹食經赤白利方

鵲雲雀鴨等任意食之又方通草子食之

龍門方治赤白痢方

煮韭空腹頓服一椀不過再驗

又方羊鮓モ桼モ烏豆服一大抄不過二三

又方取鼈尾草花曝于末服方寸匕驗

治久赤白利方第廿五

病源論云赤白利トモハ是冷熱不調シタリ熱乘於血シタリ滲腸
間ハ与腸間津液相難而下ナリ甚者腸虛不復故赤白
連滯シテ久不差也イユ

千金方治下久赤白連年ナチ不止ヤナ及霍乱シ冷實不消ニ溫
脾湯方

大黃四兩カウニクセ人參二兩 甘草二兩 干薑二兩

附子一枚大者 五味水六升煮取二升半分三服

又云治積ニ入ル卅年常下神方

赤ハニチ松樹皮カハセ去上ハニチ蒼皮カハセ一升ハニチ為散ハニチ麴ムク粥和ハニチ升服之日

三タビ不過服一升永イヌ差不差更服之秘方チ卅年利

一百日服之

錄驗方治久赤白下利補黃二錢上方

補黃二錢カラスナ上干薑二錢上二物合以酒一升下品煮服

不過四五服ヤ新良堅有

槎要方卅年痢不止方

黃連五兩カシラケ厚朴二兩ホホキ干薑二兩カラスナ阿膠二兩アカハ石榴皮セキナクハ

三兩シモキ艾葉三兩右以水七升煮取二升分二服

隨時方治赤白痢連年不差腹中如刀攪モテ或五六行カ多ク下

范汪方治赤白滯下晝夜數十行方^九

烏梅^{本分文}割取皮三兩

^{大葵令干生}

黃連三兩^九二物合下^治篩^九

和蜜丸如梧子

晨服十丸不知稍增可至三十九

晝夜可六七服若猶不差可增服七八十九其間^{ホト毛}

食勿^シ与^ア服藥相近无黃連可用干薑三兩代之^{ホフ}

小品方治^フ冷^{トホリ}微^ニ赤白滯下不斷^ヤ變^シ成^ニ赤黑血汁如爛^ク臭^ニ腸^{ホト毛}

腹痛枯瘦不能飲食方

黃連四兩^{カクテキセ}

吳茱萸三兩^{カラシカク}

當歸三兩^{ヤチセリ}

石榴^{セクク}殼二兩

凡四物以水三升漬^{ヒタシ}黃連一夕^{ナリ}明旦更加三升水煮

取三升分三服

僧深方治赤白滯下久不斷穀道疼痛不可忍方宜

服温藥熬塩麩之
 又方炙枳實麩之

瘧

赤自刺也

天方帶瘡

下病也

病源論有

痛下病

葛氏方治赤白雜帶下方

赤石脂一斤 烏梅木交卅枚 干薑三兩 合粳米一升 水七升

升煮取米熟去滓一服七合

又方罌尾草濃煮煎如薄粘服五合至一升日三

赤下用^并赤花者白下用^并白花者佳
今案救急單驗方未服方寸匕

今棄救急單驗方

治膿血利方第廿七

病源論云夫春陽氣在表人運動勞役腠理則開血
氣虛者傷於風至夏又熱氣乘之熱蘊結而化
為膿故成膿而利也所以夏月多苦膿而利膿胃
腸也

范汪方治膿血利黃連丸方

黃連カクナギ三兩 黃芩ヒツシキ三兩 龍骨リウコウ四兩 黃蘗キハタ三兩 升麻トリスアミ
三兩 凡五物 搗下篩蜜和丸如梧子白飲服

卅九日三

又云治下利赤白膿血桃華湯方

赤石脂二兩

鴆ハヤ脂ハヤ

干薑二兩附子一兩

凡三物以水五升煮得三升服一升日三

一方有粳米元附子

廣濟方療白膿痢方

甘草六分

炙

厚朴十二分

炙

干薑八分

枳殼八分

炙

茯苓フツボク三分

切

以水五升煮取一升六合分温三服

二

忌生冷油膩小豆粘食海藻

忌

治水穀利方第廿八

病源論

三

由體

トキハ

虛

溼

理

用

血氣

虛

春

傷

於

風

耶

氣

留

在

肌

肉

之

內

後

遇

脾

胃

大

腸

虛

弱

而

耶

氣

乘

之

故

留

為水穀利也九

葛氏方治水下積久不差イ腸垢已出者方

赤石脂桂干薑附子各等傷末蜜丸モ如小豆服ハカリ

三九日タビ又方石榴皮一枚黃蘗一兩干薑二兩

半以水三升煮取一升二合內膠頓服イ

醫門方療水穀利腹痛久不差方

厚朴タ黃連タ水三升煮取一升空腹服之セ

救急單驗方治水利方可有上按

煮蘆空腹頓服一匙コ碗不過再驗

治休息利方第十九

病源論云冷熱氣調其飲則靜而利也伏也腸胃
虛弱易為冷熱其邪氣或動或靜故其利宜發
或止謂之休息利也

僧深方治休息下方

煮小豆升和臈三兩頓服驗

又方煮薤コアラ空腹一椀熱服不過再驗

范汪方治息下休下方モチフルタリシ酸石榴セクロ合皮ナカラ搗取汁服之

陶景本草注柿火薑者食之ヘセクロ又方タケノカハ拳樹皮ニカハ煮汁

服之

葛氏方若久下經時不愈者名息下治之方

龍骨四兩クシ 鵲如小豆水五升者モニ取二升半セヤウモ冷之

分五服ウ又方黃連カクケクセ如鴨子大オホキ一枚モト膠ニカハ如掌ハカリ大一枚オロキセ

熟艾ヤイタモ一把水五升煮二物取二升モ澤内モ膠ニカハ洋ト

分再服ウ但濃煮ツク干艾ホシモキ菜飲之ツメ亦佳 又方

常煮忍冬飲之ヒトカラ

治泄利方第卅タシクワ

集驗方云黃帝日人苦泄クシ下利者何タシ對曰春

傷於風復生澼泄腸辟久風為澼泄

論曰澼凡有五種各不同胃泄者飲水不化色黃言

所食飲之物皆完出不消也脾泄者腹脹滿澼主食

即欬逆言下利猶如注水不可禁上也太腸澼者食已

窘便白色腸鳴切痛食訖即欲利言痛如刀切其腸也

小腸泄者而便膿血少腸痛也小腸瘵在腹故令少

腸痛大瘵泄者裏急後重數至而不能便莖中痛

也瘵者結也小腹有結而復下利者是也

范汪方治腹痛消穀心利服大豆方

取大豆トウモロコシ擇チヨウ見ミ好者コウシャ服セ一合イチカウ所シヨ日ニチ五服ゴフク日中ニチチュウ四五合イチゴロウ

後飯コノイ服セ非飯ヒイ後コノイ可投コトケ間マ服セ趣ソウ盡ジン四五合イチゴロウ欲服ヨクセ時トキ

手テ接セツ豆トウモロコシ令烟シム光明コウメイ若苦ニク堅難ケンナン小減豆コゲントウモロコシ

醫門方治イモンハツ澼利シ或白赤ニ不止ズ腸滑チウカク洞泄ドウセツ困極クニキョク欲死ヨクシ方ハツ

酸石榴皮サンシヨウ三兩サンリウ干地黄カンジツ二兩ニリウ黃蘗キヤク三兩サンリウ阿膠アコウ二兩ニリウ

水五升スイゴシュウ煮取シユ二升ニシュウ去滓キヤク分温フンオン二服ニフク

千金方チンギンハツ建脾丸ケンペイワ主虛勞シュロ羸瘦レイシュ體重タイチュウ胃冷イレイ弱不消飲ジュクフシヨウイン

食雷鳴シヨクライメイ腹脹フクテウ澼利シ不上フセ方ハツ

鍾乳シヨウニ二兩ニリウ赤石脂シヤクシツシ二兩ニリウ好麴コキョク二兩ニリウ大麥ダイマク蘖ニョ二兩ニリウ當トウ

婦二兩

カクキレセ

黃連二兩

カクネクセ

人參二兩

カクネクセ

細辛二兩

カクネクセ

龍骨二兩

干薑二兩

干姜ト

茯苓二兩

茯苓ト

石解二兩

石解ト

桂心二兩

附子二兩

蜀椒分

凡十五味

モ

白蜜九

ハカリ

如梧子

モ

酒服十五丸

モ

日三稍加至

モ

卅丸

モ

弱者飲服此方

モ

通治男女丸

モ

此方治利之

モ

方神驗者也

モ

方云

モ

利食不消不作肌膚

色重下

多小腸

泄利不禁少腹絞痛

多脾命

泄注便膿血五

隨年壯

下三寸今案千金

多丹田穴百壯在香

下三寸今案千金

下三寸今案千金

下三寸今案千金

方云
三報

治重下しりヲモ方第卅一

葛氏方云重下トスレ此謂イフ今赤白痢下也今人下部しり疼痛ヒル重故名重下ル去膿血如鷄子ル白日夜數十行繞香治之方

熬クキ豉ル令小焦ル搗ル服ル一升日再三タ名

又方烏梅ル廿枚打破ル以水二升煮取一升頓服ル

又方赤石脂ル一升烏梅ル廿枚干薑ル三兩粳米ル

一升水七升煮取米熟ル去滓ル一服七合ル

龍門方治重下ル方取鼈尾草花曝ル干ル未服ル三方寸

七驗ル又方末黃連ル和水服之ル

令李方治下利重下方

干薑二兩 蜀椒二兩 桂心二兩 凡三物治下利以漿

許後下部中内イヒラ半ハ点ハ治毒ヲモ

范汪方治重下方暴滿一席一握也口以水三升煮取一升頓

服不過再神良

錄驗方治下腹中絞痛重下ニ赤白當歸散方

當歸二兩 黃蓮二兩 黃蘗二兩 干薑一兩

凡四物合下ホシタ後以烏梅汁服方寸匕日三若腹

中絞痛加シホリ當歸下ヤナセリ赤加ヘシ黃蘗重下キハタ增チ黃連白

下増干薑

治痢^{セリ}利方第卅二

病源論云甘^{上ハ}是人^{九ナリ}有嗜甘味^五而動腸胃間諸虫致

令侵食府藏此指是蠱也^{女シ奈ル虫}從腸裏上食唯咽^{ツムト}齒

斷^{ハシ}並生瘡^{ナシ}下至穀道傷爛^セ下利膿血^{ヨリ}

要急方治赤白痢利方

頭髮灰^セ如鷄子^{セカリ}大水服立驗^{オホキモウ}

龍門方治痢積^利并出無禁心者

並兩手^{コアラ}握細切^{トリ}豉^{コカニモシ}一升酒三升煮取一升頓服^ク不

過三劑差イエ支

治靈注利方第卅三

病源論云歲時寒暑不調則有濕毒之氣傷人隨
漸至於藏府大腸虛者毒氣乘之毒氣挾氣与血
相搏則成血利毒氣侵食於藏府如靈注之狀利血
アツアルトキ
雜膿痰黑有片如鷄肝肝血雜下是也己ナリ

小品方治時歲靈註毒下諸湯モ煎不能治欲死者方

方干薑二兩附子二兩

炮 梔イ 枳イ

黃連二兩檳石二兩九四

物為散酒服モ方寸匕日三 二可以飲服

又方黃連カクアケセ一分麵今キ二分治未蜜丸水服今カ如梧子

葛氏方若時歲今注毒下者方

黃連キク黃蘗キク分等梔ツル藍アヒ汁ミルラモ丸如梧子服今六七丸至

十四九五二三三又方秫米アハモナ一升燒成ヤイ炭水炭三升和飲之モ

治不伏水本利方第廿四六注

病源論云夫四方之氣溫涼不同隨方嗜欲因成性
若移其舊ヲク久去多不習伏必因飲食以入腸胃不
習便為下利故名不伏去利也ト即以水穀利是也
僧深方治諸下利胡虜之人不習食穀下者方用

白頭公オキナモ二兩 黃連トネリコ四兩 秦皮キハタ二兩 黃蘗キハタ二兩 九四

物以水八升煮取二升半分三服

本草拾遺云舊著鞋履下云主人適他方不伏水

云刮取コソク末和水服之不伏水ハル与諸病有異者是也

治嘔逆吐利方第卅五

病源論云嘔逆吐利者腸胃虛耶氣并之藏府

之氣自相尅也ル

新錄方治利兼吐逆及嘔者ニハ

葱白キツネ豉シ各一升 水五升煮服一升六合分三服

又方干薑末方寸匕飲日二

僧深方治胃脇有熱胃中支滿嘔吐下利方

黃芩二兩人參二兩甘草一兩桂心一兩九芻

水八升煮取四升分四服日夜一

治利兼渴方第卅六

病源論云夫水穀之精化爲血氣津液以養藏

府之虛受風邪入於腸胃故利之則津液空竭

藏虛燥故利而兼渴也

僧深方治少陰泄利不絕口渴不可食虛而兼煩

方附子一枚干薑半兩甘草二分葱白十四枚キクネ丸四

物以水三升煮取一升二服先渴後飲者カク心有傳

水一方加犀角カク一兩

又方厚朴ホカハクキ炙搗末酒服方寸匕日五六

治利兼腫方第卅七

病源論云利兼腫者是利久脾虛水氣在於肌肉之間所為也

新錄方治利兼腫者

素根クハクハク白皮切一升水四升煮取一升七升去滓カク內糖アメ三合

和洋^{トカシ}分^ニ三服^ヲ又方大麻子三升水一斗研取白汁^{ホク}者

赤小豆爛^{クラセ}散^チ豆飲汁良

治利後虛煩方第廿八

病源論云利後虛煩者由府藏尚虛而氣內搏^{トスリ}之

所^ナ為^ル也

小品方大烏梅湯治被下^ニ之^ガ以後虛煩燥不得眠
劉者^ガ山顛倒心中悞^ニ懷^ガ方^{奴道又}

大梅十四枚擘^{ツキ}好^{ツキ}豉^{ツキ}七合^{ツキ}凡二物以水四升煮梅

令得二升半內^ニ豉^{ツキ}令四五沸得一升半分^ニ二服

千金方治下後煩氣暴上ツホル香薷湯方

香薷兩五イヌヒ生薷一名乃良一ツ把冬用子ア三兩 凡二物水五

升煮取二升頓服

僧深方治大下後虛煩不得眠劇者顛倒懊懣

欲死方三ツキヌシ支子十四枚ツキメ擘好豆豉ツキメ七合凡二物水四升先

煮支子令ツキメ餘二升半汁乃內豉ツキメ二三沸去滓ツキメ

服一升ツキメ一服ツキメ安者勿復服若上氣欬逆ツキメ加橘皮

二兩ツキメ一点可加生薑

治利後不能食方第卅九

病源論云利後不能食者由脾胃虛弱氣逆胃間之所為也

千金方治大下後腹中空渴胃中虛滿不得下食方

芍藥一兩芒飢飢甘草一兩厚朴二兩當歸二兩半斤生薑五兩桂

厚朴二兩半斤九七物水八升

煮取三升分三服

病源論云下治利後臍方第卅斷ヤムチ之後脾胃虛氣逆遇冷析之其

氣不通則令噎七ツセ

范汪方治大下之後下止臨臍胃中滿塞水漿

不下方

橘皮一兩人參二兩カミナ 香豉一升一方一兩桂心二

兩生薑五兩半シスシカア 夏三兩甘草一兩九七物切以ホソクア

水九升煮クキ 豉取七升クキ 去滓ホソクア 內諸藥ホソクア 熾火上煮ホソクア

取二升半タレホ 分三服

治利後ル 達滿方第卅一

病源論云利後モ 而心下達滿フル 者猶藏虛心下有停

飲氣達乘之所為也

范汪方治中寒下以後心下達滿フル 上衝胃中ホソクア 起

欲頭眩方ホソクア

丁卯木
伏苓四兩桂三兩白朮二兩甘草二兩凡四物以

水六升者取三升分三服

治利後穀道痛方第卅二

病源論云利久腸虛耶客於肝門耶氣与真氣
相搏故令疼痛也

新録方利穀道疼痛方

炒塩熨下部

又方燒蒜去皮内下部良

范汪方利穀道痛方

灸枳實熨之

集驗方治赤白滯下久不新穀道疼痛不可忍宜脹溫藥灸塩熨之

醫心方卷第十一

醫心方卷第十一背記

陟厘

小品方云水中麻苔也范東陽云水中石上生如毛綠色者藥對云河中側梨也陟厘聲相近也

又案藥對云河中側梨此則勸音非厘音也

以上弟廿一葉

醫心方卷第十一札記

三頁上 永障千金永

四頁上 便賣今本時後賣作買

賣即齋

九行 燒酒千金燒下

下一 秘方千金方

八行

注 淫云

仁和寺本注字不塗

五頁上

病者

外臺者

六頁上

又

方

仁和寺本補外臺引梯

下九

又方云

仁和寺本無方字

七頁下

記 飲和

仁和寺本二字外臺引肘後同

八頁上 薑累

仁和寺本薑下

有一

下六

腸胃

仁和寺本洞下不止七字病源同

九頁上

消故

仁和寺本洞下不止七字病源同

下七 葛氏方

仁和寺本此一行

除在合案

九又云

仁和寺本作葛氏方治四字

十頁上

遶里

仁和尚寺本處下有連字外

十一頁 歲之仁和尚寺本無

下三 二五兩 仁和尚寺本無五字

八頁 巨闕 仁和尚寺本無作巨闕 十二頁上

一 虛冷 仁和尚寺本無

下六 霍亂煩渴者 仁和尚寺本無下有

由大吐逆上焦虛氣不調理氣

九 黃藥 外臺引時

十三頁 稍飲之勿飲餘飲 仁和尚寺本無下有

九 梁米 仁和尚寺本無

十四頁 薦索 肘後作

之 千金此下有一 胃管 千金此下有尺沢并治

十五頁 下 已向 仁和尚寺本無 十六頁 霍亂大吐下 仁

寺本無 下有後字 六 逆 仁和尚寺本無下有 四 逆 仁和尚寺本無下有 三

兩仁和一雨

行甘草二兩仁和一雨

十七頁而欲

無而字

行雅吐仁和有奇本雅

行故欲死仁和一奇

有也字

亦頁下

論冷千金論

甘盞千金作

行而

難千金而

行加其千金其

下九行大須千金作

下九行五合千金作

服之千金作

上五行燒末外

燒作

下二行是利千金久

行二味千金此下有

行枳殼外臺作

一世頁上

入腹病源腹

下九日星千金

作星

卧息千金作

上八行也則病源作

上一行

一升千金作

下三行

宜發或上

發病源作

下三行

人隨

病源隨下有無脈血氣四字

行挾氣

病源氣作契

世五頁者猶

病源者下有此字猶作由

醫心方卷第十二

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治消渴方第一

治渴利方第二

治內消方第三

治諸淋方第四

治石淋方第五

治氣淋方第六

治勞淋方第七

治膏淋方第八

治血淋方第九

治熱淋方第十

治寒淋方第十一

治大少便不通方第十二

治大便秘通方第十三

治大便秘難方第十四

治大便秘禁方第十五

治大便秘下血方第十六

治小便不通方第十七

治小便難方第十八

治小便數方第十九

治小便不禁方第二十

治小便黃赤方第二十一

治小便血方第二十二

治遺尿方第二十三

治尿淋方第二十四

治消渴方第一

病源論云消者渴渴而不小便是也渴ト云由少服五石セカ

諸丸散積經年歲石熱結於腎中使人下墮ムラト虛熱ナラシメ

及至年衰血氣減少此九之證也不復制於石熱獨盛則腎

為之燎腎カク燎故引水而不小便也其病變多癰疽此坐熱氣留於經絡カク不利而氣癰滯故成癰膿カク

千金方云論曰凡積久興セトモ酒未有不戍消渴然則

太寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加肺セトモ

炙石塩醎無以喻此之アフリモウ二味酒客耽者不離其口三ミハナクミナ

觴之後制不由已飲敢無度咀爵カク酢腎不擇酸カク

誠積年長夜酣興不態遂使三焦カク猛熱五藏于カク

燥木石猶且焦枯在人何能不渴カク

小品方云說曰少時服五石諸九散者積經年歲

人轉虛耗石勢結於腎中使人下焦虛熱小便

數利則作消利之病不渴而小便自利也

作消渴之疾但渴不利也又作渴利之

病隨飲小便也又作強中病者莖長興終不

痿溺液自出也作瘰癧之病凡如此等宜服猪

腎薺薺湯制其腎中石勢時餽鴨通丸便差也

其方在本書又云鈆丹散治消渴與便方

鈆丹二錢 枯樓十錢 澤馬五錢 石膏五錢

病源論云強中病者是由少壯五石之熱主於腎中下焦虛

鈆丹一名鈆華 和若多尔 本草朱朱精也 古藥文 澤馬一名并才也 石膏一名細石

赤石脂五分一名白堊白石脂五分一名白堊胡椒二分甘草十分

凡八物治下カクキ獲フルヒ瀉服方寸匕日三不知アケヒ稍增イエ年壯セヨ

服半匕得病一年服藥一日愈二年二日老甚ナラ

者モウハ夜以水服勿用酒セヨ

又云治亂レ曰飲一石許小便不通古考枯樓丸方

枯樓三分カスガウリ鉉丹三分一名牙子萆根三分カスガウリ附子一分一名牙子炮イリフ

凡四物治下カスガウリ萆丸如梧子飲服十九日三セヨ

又云治消渴方蜜在本書

取活螺三升イキミ以江水一石養之イキミ頤取令汁イキミ配飲之イキミ

經曰放去更取新者漬之

又云灸消渴法

灸兩元一處又俠兩旁各二寸二處各灸廿壯五

日一報至百五十壯今葉明堂云兩元在膺下三寸

千金方治消渴方

飲豉汁任性多少又方濃煮竹根汁飲之

又方煮青梁米汁飲之

又云栝樓粉治大渴秘方

深掘大栝樓厚削皮至白處四寸切之水浸一日一

易水經五日取出カヨ搗ツイ以絹帟カトリ碎之クシテ如米粉セヨ法水服
方寸匕日三四フクヒヨシ點ニ可作松粥乳酪中食シ之不限セシ多
少取トメヨ差サ心

葛氏方治卒消渴小便多方

多作竹タケノミル壓ヲシ飲ハシ恣ニセヨ口數日愈イエヌ

又方破故屋凡煮之多飲汁

又方石膏半斤搗碎以水一斗煮取五升セヨ稍服

又方枯樓根カスミナ薄切ハ炙五兩水五升煮取四升セヨ飲之

錄驗方治消渴日飲六七斗小麦湯方

聖惠方卷之二十一

小麦コメ一升

栝樓根カラシナ切キ一升

麦門冬セリソノ一升

右三物以水三斗煮取一斗半飲之

新録方治消渴方

是汗恣意飲之取差止

鴛生葛又方汁飲之

龍門方療消渴方

生胡麻油ナツ一升頓服之立驗

天方爛煮葵汁又方量冷露中每渴即飲之

僧深方治消渴シキヒル唇干口燥カヤ芍杞湯方

芍杞根一升五升 剉皮剉石膏一名細石一升 小麦コメ三升 一方小豆

凡三物切以水加上後手合煮麥熟湯成去滓ハシ適ニヨ寒溫飲之ハシ

搔要方療渴身體痠腫方ハシ

第根三斤ナニ槌破ナニ以水二斗煮取二升ナニ日服盡ハシ可日ナニ服ハシ一劑ナニ

經心方黍米湯治渴神方ハシ

干黍米一升ナニ以水三升煮取一升ナニ去滓ナニ服ナニ一升ナニ日再ナニ服ナニ良ナニ

耆婆方治人渴方

枯樓カラコ十兩

白梁米シロヤシハ五小升

右以水一斗二升煮取三升去滓カ分三服

范汪方治消渴湯方

麥門冬ヤト一兩

土依根ヒサク二兩

竹葉一把

凡三物咬咀ミ水七升煮取モ令得三升ヨ分再服神有

驗

陶景本草注治消渴方

煮律草ニタ汁及生汁ハク服之セ

又方イカモリ搗冬依紋ニホ服汁ヨ

蘇敬本草注治消渴方

食大麥ヤハ麵良ハキヲコ

又單食麥ハキヲコ堪良ヘスハア

又方粟米アヲシ臭泔汁シホ飲之立イエヌ差

孟詵食飢消渴方

麻子マ一升ハシ搗水ミツ三升ミツ煮ヒテ三四沸ヒテ去滓キス冷服ヒヤク半升ハシ旦三ミツ

五日即愈イヘヌ

今業渴家可食物

穠蜜煎一名細石治消渴補内

寒水石一名白石本草云主消渴

石膏一名細石本草云主消渴

大麥本草云主消渴和名不止半文

青梁米本草云主渴利和名安波乃米

小麦本草云止渴和名古半文

粟米

本草云主消渴和名云阿波乃字田之祢

赤小豆

本草云主消渴和名云阿加阿都支

猕猴桃

崔禹云主消渴和名已久波

焉芋

本草云主消渴和名久和焉

菰根

七卷食免云除消渴和名已久乃祢

竹筴

本草云主消渴和名多加芋奈

冬花

本草陶注云消渴和名加毛宇利

葵菜

崔禹云消渴和名阿不比

松菜

本草云消渴和名太加奈

蘆荻

本草云主消渴大有驗和名於保祢

紫萼

七卷食經主消渴和名波久倍良

蓴

本草云主消渴和名奴奈波

骨蓬

本草云主消渴和名加波保祢

石莖

崔禹云治消渴和名左右色

紫呂

崔禹云心消渴和名頃半乃利

牛乳

本草云止渴和名宇之乃知

酪

本草云止渴

鹿頭

崔敬云主消渴崔禹云主消渴

鯉魚

本草云止渴
和名已比

海月

崔禹古主消渴
和名久良介

鱖

本草云心渴
和名加支

主可有欬

石陰子

崔禹古主消渴
和名加世

龍蹄子

崔禹古消渴
和名也

寄居

崔禹古主渴
和名加手奈

河貝子

崔禹古主消渴
和名三奈

田中羸子

本草云止渴
和名多都比

渴家可忌物

千金方云所慎者有三一則酒

物

二則房室三則

鹹食及麵

養生要集云小麦合

ルキコ
菰米食

復飲酒令人消渴

小品方云忌食猪肉

サウコ

治渴利方第二

病源論云渴利者トホ隨飲隨少便是也血由少時未眼乳石或元時字

、契盛時房室過度致令腎氣虛耗三下焦生熱洋到又

、則腎ムネ燦シ、則渴然三腎ムネ虛又不能傳制水時忍又

液故隨飲隨小便也血

葛氏方治大渴利曰飲數斛小便亦尔者方血

枯樓カク楼黃連カク連防己アラカシ鉛丹一各鉛草分等血鶴末以苦酒一合

水一合和作漿服方寸匕日三

范汪方治渴日飲一斛小便如之カク枯樓湯方古治又

枯樓カラシ二兩 黃連カシ一升 甘草二兩

凡三物水五升煮取二升半分三服

集驗方治渴日飲一斛者方

入地三尺取桑根白皮炙令黃黑ナラ細切コトカニ以水令相淹ホトホカセ煮之以味濃ユキ為度ナラ飲之勿与塩与米非嫌大驗

治内消方第三

病源論云内消病者不渴而小便多トエ是也キ由少服石

契結於腎内也勢之所作也

小品方云夫肉消之為病皆熱中而作也小便多於所飲令人虛極短氣肉消者食物皆消作小便去而不渴也治之凡凡芎藭湯コ

芎藭救急散

冬根三兩

桔樓根カキルノネ三兩

石膏一名細石三兩

一方

黃連カクイモ三兩

甘草二兩

凡五物切以水一斗煮取三升一服五合日三

又云治小便多晝夜數十起方元

小豆生藿アヅキノナミハ一把凡一物搗絞イ取汁頻飲シ三升便

愈急治小兒利シモ

令李方治ル小便利多秦膠散方

秦膠ハカリクセ一炙 陳芥子フルキ カラシ二炙

凡二物治下篩酒服方寸匕日三セヨ

治諸淋方第四

病源論云諸淋者由腎虛而膀胱熱故也其狀小便出少起數小腹絃急痛引於膺ルキナ アテタヒシ ニ ハリスク

葛氏方治卒患淋方

炙足大指前節上十些良セヨ

又方炙兩足外踝中央追年性有石即下

卷一

又方但服^{セヨムハナフ}葶草汁^{ヒクシ}一^{ハナフ}斗不過^{セシ}三^{ハナフ}斗治石淋^{アモ}

又方豉^シ一^{ハナフ}斗水三^{ハナフ}斗漬少時以塩一合内中頓服^{セヨ}

經心方豉^シ半斗水四^{ハナフ}斗煮
一沸頓服立通不加塩^{セシ}

搔要云療淋方

石者石鷲汁飲之良驗以水煮之

范汪方治淋滑石散方

葵子^{アヲヒ}一^{ハナフ}斗滑石^{アケヒカハラ}一^{ハナフ}兩通草^{アケヒカハラ}二^{ハナフ}兩

凡三物治後酒服方寸匕日三

又云治淋枯樓散方

石鷲^{石鷲}
永州祁陽
縣西北百
十五里七
泥上掘深
丈餘取之
形似烟斗
小堅重如石
者也
俗云因雷
自石穴出
隨雨飛墜
安也

石棗イハダクハ二分

通草アケヒカサ一分

桔樓カラシ二分

葵子アズキ四分

凡四物治後先食以麥粥服方寸匕日三無不愈セヨ

不又方常以冬葵根作飲良アズキヲネ

小品方治淋病不得小便陰上絞痛方セヨ

冬足大衝五十壯セヨ在足大指本前後二寸

又方灸懸泉一名中封十四壯セヨ中封在足內踝前

廣利方理諸淋小便卒不通方オモキ

麻根二十七枚切キ

右以水二大升煎取八九合七升九合去滓七分溫三服三

集驗方卒得淋方

取牛耳中毛ヤイ燒服半錢上立愈イ文

又方以比輪錢オホセニ三百文以水一斗煮得三升飲之ヤイ

千金秘不傳ニモ

錄驗方治淋瞿麥散方

瞿麥トナミ四兩 石葦イハス四兩去毛 滑石クダク四兩碎

車前子オホハコ四兩 葵子アウシ四兩

凡五物アタ搗篩冷水服方寸匕日三增至五匕シ慎ハシメ

涓麵ムキコ

新錄方治淋方

馬覓荃菜鳩汁ムキヒル一升クキハ二三服ハキタヒ

治石淋方第五ト云ハ

病源論云石淋者淋而出石也腎主水ト云レ結則化為

石故腎容沙石ト云レ腎虛為勢所乘ト云レ熱則成淋其狀

小便荃裏痛尿不能卒出痛引少腹ト云レ膀胱急ト云レ

沙石從小便道出甚者塞痛令悶絕ト云レ

小品方治石淋神方

馬覓荃菜鳩汁

ト

車前子チホコ二升以絹囊盛以水八升煮取三升盡

服之セリ日移一丈石子當出宿不食飲之良

又方生薑生律タラ荃菜合搗取汁服一升日三

又病石淋者下廿六種病不得小便方

灸用元卅壯セリ時千金方又方灸大敦卅壯在足大指端去

又方灸氣門卅壯

錄驗方石淋方

取車前草チホコ煮多飲汁

又方石車イソクサ三升滑石三升

凡二物下後合以米汁若蜜服刀圭上日三已効

効

葛氏方石淋者方

取鸞矢末以冷水服錢五上清旦服至食時

當溺石

又方取故甌敵燒三指撮服即通

又方石首魚頭中石一升貝齒一升合搗細篩

以苦酒和久為三久宿不食明旦服一分曰

中服一升暮服一升明日旦石志下

今案食經云鱧頭中有

鯢音恁
和名伊之毛知

石叵南人呼曰
石首魚者是也

千金方石淋方

和名加智人之

浮石取滿手下篩水三升酢一升煮取二升澄
和氣力也
飢下三三
 澄清服一升三服石出

本草拾遺云有以病為藥者淋石主石淋水磨服之當碎石シツネ隨溺出也人患石淋或於溺中出正如小石非他物也

新錄方治石淋方

生葛根汁服五六合

又方慈白三升水六升者取二升五合三服キヲネ

陶景本草注者麻根飲之ツタ

蘄敬本草注鳩為芋根汁一升服之ハナシ 桑サネネ シロ桑サネネ

崔禹食經者葵子服之汁アヲヒ

治氣淋方第六

病源論云氣淋者腎虛トスハ膀胱タリタ名熱氣脹而為也其狀

膀胱少腹皆滿尿澀タリシノシ常有餘瀝是也旁光三音

千金方療氣淋方

灸關元五十壯又灸夾玉泉相去一寸半壯

醫心方卷十二

十三

小兒方治淋方

取附恥底苔

大如鴨子以

區半水煮

取二區服一
外日三

又方水三升煮附恥底苔九如鴨甲大取二升一服ハカリケル 一三

又方鵝葵子アヲヒ末湯服方寸匕モ

廣利方理氣淋脂下切痛方モリガコシ

以塩和少醋填脂中塩上炙セキ二七炷トコ立差

治勞淋方第七トク

病源論云勞淋者トク謂勞傷腎氣イハクストク而生熱成淋也シ腎

氣通於陰其狀尿管垂內數起不出引少腹痛小ハリ

便不利勞倦即發エタモシモ

千金方療百淋寒淋熱淋勞淋小便澀脬中滿腹

急痛方

桔樓カラルツリ三兩

滑石二兩

石牽イハシカハ二兩

三味大麥粥モチ飲服方寸匕日三

治膏淋方第八

病源論云膏淋ト云者淋而其肥狀似膏故謂之膏淋有本如此

急日肉淋此腎虛時忍反不能制其肥液相與小便俱出ト

千金方云膏淋之為尿ナリ似膏自出療之一如氣淋トモ

也 鳩蓐草汁サツルムハナ二升酢セ二合和空腹服之セヨ

治血淋方第九

醫心方卷十二

上

病源論云血淋者是勢之甚者則尿血謂之血淋心

主血之行身通遍經絡脩琛府藏勞熱甚者則散

失其常經溢添入胞而成血淋之

廣濟方治血淋方

車前葉オホハユ搗取汁半升和蜜一匙攪令銷頓

服之立差セヨ トヨイ廣利方

龍門方治血淋方

取刺蓴根アサ勿見風大一握淨洗搗取汁半升

外服之極者不過三良セヨ 安依美

千金方療血淋方

石棗イハカハ

當歸トウセイノウサリ

蒲黃カクハク

夕藥モルシカ

四味丸

等酒服一錢上日二セウ

又方水五升ヲ煮麻根十枚取二升頃服

又方水四升ヲ煮大豆葉一杞取二升頃服

又方灸丹田隨年壯在脊下二寸今葉明堂

玄石門一名丹田

治熱淋方第十

病源論云熱淋者三焦腎之府也有熱氣搏於腎流入於肥膀胱

上焦中焦
下焦

而成淋也其狀小便赤澀アカシシ而有宿為淋今得熱而發者其熱則變尿血ハナ有小便後如豆羹汁狀者畜作有時

葛氏方熱淋方

取白朮根チウネ四升子母又破也折傷也剉之ツケ水一斗五升煮令得五升

汁セキ服日三ツヒ千金方同之

又方末滑石屑ツク水服セキ二三合

錄驗方治熱淋方

檄節也
シヤイ花

蘆心アヒノナカ切三升水五升煮取二升三服

千金方治熱淋方

常煮冬葵根イヌヒ作飲服之

又方冬セヨ葵イヌヒ根与氣淋同セヨ

又方葵根イヌヒ一升冬用子ア

大棗オホナハメ二七枚セナ去核セナ

二味水三升煮取一升二合分二服セハ熱加黃ヒツシキ葵イヌヒ

一兩出難ヘヨ加滑石二兩

渠金炙

龍門方療熱淋方

服冷水三升行ハカシ一里即下セ又

又方灸兩足外踝中央隨手忙有石下

廣治方療契淋小便澀痛方

車前草オホハナ切アケヒカヲ一升通草三兩葵根切アケヒカヲ一升

芒消六分湯モテ成セヨイヌ切アケヒカヲ以水七升煮取二升去滓內芒

消分溫三服忌契食

治寒淋方第十一

病源論云寒淋者其病先寒扶或本无此字戰然シス後尿是也六の十七由腎

氣虛弱下焦受於冷氣氣入肥與神交又腹内也心氣交爭寒氣勝

則戰寒而成淋心氣勝戰寒解故得小便也

新錄方治寒淋少腹下冷手足冷方

葵子アフリヒ一升、麴カウケイ末一升、水六升、煮取三升半、三服。

又方葵子一升、小麦水一升、六升、煮取三升、三服。

治大小便不通方第十三

病源論云：開格トマ大小便不通也。大便不通，謂之內閉。

小便不通，謂之外格セリ。二便俱不通，為閉格也。由陰

陽不和，榮衛不通也。

千金方治開格大小便不通芒消湯方

芒消一名石脾五兩、大黃オホホ八兩、芍藥セヒルツリ四兩。

杏仁カラヒナシネ四兩、麻子アサ仁三兩、烏桕樹根皮和名佐之布乃支五兩。

凡六味以水七升煮取三升分三服

又方桑白皮下一寸三分

又方桑白皮文百枚

又方甄トシホウ帶トシホウ煮取汁和蒲黃カタノハナ方寸匕日三服モ

又方葵子アヲヒ一升榆皮ヤニヒ切一升水五升煮取二升分

三服

葛氏方治卒ニ開格大小便並不通交滿ニ欲死ニ三日則斂ニ

人方

取塩以苦酒ル和塗脊中ス干復易之ヘヨ

又方自取手十指以甲燒末以酒漿服

又方葵子二升水四升煮取一升頓服之內猪

膏如鷄子一九點佳

集驗方治久不得大小便方

猪脂如鷄子著一杯酒中煮之令沸頓服

又方煮葵根汁服弥佳

范汪方治大小便不出方

豆豉冒內下部中令人吹則通小便以塩內

莖中則利良

經心方滑石散治大小便不通方

滑石二兩

榆皮ヤニシ一兩濃ク本有之

葵子アヲヒ一兩

凡三物作散。煮麻子一升半取一升以兩匕和

服不過二大セ小便通千金方

廣利方理氣擁開格不通小便淋結脊下妨悶氣

兼痛方

冬葵子アヲヒ二大合

生薑根ナツメ一握以水一大升

半煎取六大合去滓ナカ分溫二服

又玄開障不通肥脹妨悶太小便不通方

冬葵子三大合綿裹滑石十二分碎

礞消十分下陽成切以水二大升煎取。

八大合去滓力化空腹分溫再服別如人行ハカリ四方ム

五里忌肉麵ヤ

治大便不通方第十三

病源論云大便通不トス者猶三畦五藏不和冷熱之氣由ヨリチ子地反

不調イハホラ熱氣偏入腸胃津液竭燥故令糟粕不カハク結並各及糟酒滓也擁

塞不通也

葛氏方治大便不通方

胃方卷之二

七

研麻子以米雜為粥食之亦可直煮麻子飲服之

又方剥烏梅皮以漬腎豆中導下部

范汪方治大便不通方

用豆腎內下部中則通

又方腎中菴切令如指長三寸內大孔中

秦羨祖方不得大便數日方

作熱湯著瓮中人居其中湯未冷則寒

又方灸下部後五斗壯老良

千金方治大便不通方

桑根一朶クハノネ去赤皮セキヨ

榆根一朶ヤニシノネ去赤皮セキヨ

水三升煮取一升半分二服

又方恒煮麻子取汁飲之

龍門方療大便不通方

取膠カハ廣二寸長四寸チヤネ葱白一握以水三升和煮消

盡去滓セキ一服ヤリ驗

又方熬葵子半升イケ アフヒ鳩末トビノコ以水一升煮服之コ

醫門方療下部間塞コト大行不出方

取烏梅ホシムス卅枚柏ナラ碎湯中浸少時ヒタシ去核セキ棗ナツメ之如渾ハカリ

丸大一枚ナホキ内下部イシヨ中ミナ立通トヨ

小品方大便閉塞氣結心滿方

三枚

灸石闕百壯今葉明堂在臍門下二寸
臍門在巨關旁半寸

又方灸足大都隨年壯

經心方夕藥湯治脹滿大行不通方

夕藥ニヒルカ六分リ芒消一名石脾六分ヒラキ黃芩ハセシハ五分

大黃オホシ八分カラモ杏仁セネ八分

凡五味丸ハカリ如梧子セヨ飲服十五丸日三サミ

華他方云有病日食二斗米至二百日不大便亦无
ル所病苦何ル以尔名ル為何等病也此為穀瘦也穀
氣液并道中去雖无病下閉不通不可長久治
之方

葛根ル五斤 猪肪ル三斤

凡二物葛根ル根ル細ル坐ル洗ル之以水三斗ル煮ル之得

一斗半去滓ル復ル煮其汁得七升已取猪肪

肪切ル煮之成膏ル著ル葛根汁ル中ル煮使相得四

升ル所服二升二日盡之下ル開通營衛ル澤藥

無兩禁服此藥開六府壅下礼

治大便難方第十四

病源論云大便難者由五藏不調陰陽偏有虛實三焦不和則冷熱并結故也下チホク

又云渴利之家大便急難為津液枯竭致令腸胃乾燥カキキカ分

葛氏方云脾胃不和常患大便堅強難者ナレ

大黃三兩オホシ

夕藥三兩モロク礼リ

厚朴三兩ホトクバキ

枳實六斤カラタチ

麻子人五合マシ

鴉蒂蜜丸モ如梧子分服十九日セヨ三稍セ增止以通

利為度可恒モ將井ル之

千金方治大便難方

單用ヒト豉キ清ヒモ腎ヒモ清ヒモ羊ハ酪ハ土ハ依ハ根ハ汁ハ並ハ單ハ灌ハ

之トコロ立ハ出ハ又方ハ腎ハ清ハ漬ハ為ハ梅ハ灌ハ下ハ部ハ中ハ

又方ハ麻油ハ二升ハ內ハ葱ハ白ハ三寸ハ耨ハ令ハ里ハ去ハ障ハ待ハ

冷ハ頓ハ服ハ又方ハ炙ハ萊ハ菴ハ三ハ壯ハ

又方ハ夾ハ玉泉ハ相ハ去ハ各ハ二寸ハ炙ハ之ハ

新録方大便乾骨立者方

灸胃管穴千主セヨ

又方生地黄切キレ三升ヨミラ菲切ヒラ三升ヲ以水一斗煮

取二升五合久三服相去十里ハカリ

又方單服馬薊汁ナニ一升ナヌ

又方鴆モチ蘇ヨハカリ為泥ナダ酒服タビ如棗日三タビ

又方燒魚為灰糞乱文酒服方寸匕日二三

又方服ヨ飢帶コイホラ汁五六合日二

茱祖方治大便カクテリ牢難シ腹カクテリ契連日欲死方

甘遂ニミシ羌花ヒミシ黃芩ヒミシ凡三物ハカリ等ハカリ鴆ハカリ如小豆ハカリ

服五九不通更服三九九ハセ

華他方治大便堅數清不能得出方

皂莢末カハラシキヲキ下蒂以猪脂和合葦管長一寸以指排ヲテス

内穀道中者指一節須臾則去セヨ

又玄二車丸主臨飯腹痛不能食復又大便難方

大黃十三兩 紫胡四兩 細辛二兩オホシ さいし さいし

伏苓一石 半夏一兩フシホト ホノクミ

凡五物治蒂丸以蜜飲服如梧子五九日再カクシ 五ハル

集驗方治大便牢難腹熱連日欲死方

鋪薄故又
又作糊

醫心方卷十一

蜜白如麴蘇甘美也

一一〇八

白蜜三升於竅火上煎之使如強鋪以投冷水

中須臾當凝出九ハカリシ如手指大長六寸七寸內

穀道中即得通

又云不得大便十日或一月煩滿欲死方

葵子二升水ハカリシ四升煮取一升去滓頓服之

治大便失禁方第十五

病源論云大便失禁者大腸與肛門虛冷滑故也肛

門大腸之候也俱主行糟粕既虛弱冷滑氣不能

能溫制故使大便失禁之

並各及糟酒淨也

千金方治老人小兒大便失禁

灸大指^{セヨ}奇間^{イダ}各三壯兩脚

又方灸兩脚大指甲^去一寸三壯

治大便^{クダレ}下血^{キヲ}方第十六

病源論云此由五藏傷損所為藏氣既傷則風邪易入熱氣在內亦大便下血其前便後下血者血來遠也前下血後便者血來近也遠近者言病在上焦下焦也

小品方云諸下血者先見血後見便此為遠血宜服

鋪薄故又
又作糊

蘇氏曰：「之」者，「十一」

蜜白如麴，蘇甘美也。

白蜜三升，於竅火上煎之，使如強鋪，以投冷水。

中須臾當凝出九，如手指大，長六寸七寸內。

穀道中即得通。

又云：不得大便十日或一月，煩滿欲死方。

葵子二升，水四升，煮取一升，去滓，頓服之。

治大便失禁方第十五

病源論云：大便失禁者，太腸與肛門虛冷滑故也。肛

門太腸之候也。俱主行糟粕。既虛弱冷滑，氣不能

能溫制，故使大便失禁之。

並各及糟酒滓也。

千金方治老人小兒大便失禁

灸大指^{セヨ}奇間^{イダ}各三壯兩脚

又方灸兩脚大指甲^去一寸三壯

治大便下^{クダレ}血方^{ナラ}第十六

病源論云此由五藏傷損所為藏氣既傷則風邪易入熱氣在內亦大便下^{九レ}血其前便後下^下血者血來遠也前下血後便者血來近也遠近者言病在上焦下焦也

小品方云諸下血者先見血後見便此為遠血宜服

黃土湯若先見便後見而此是近而宜服赤小豆

散赤小豆散方

赤小豆三升熬

當歸三兩ヤトセリウセリ
オホセリ

凡二物治發眼方一寸匕日三

今案令李方黃連二兩酒服

黃土湯方

竈中黃去半升綿裹カトノユノアカキ
モテマツリ

甘草三兩

炙アツシ

干薑二兩

黃芩三兩

阿膠三兩ニミカハ
陶景注云出東阿故名之

炙アツシ

干地黄五兩一方三兩

凡六物以水一斗煮取

取三升分三服

今案集驗方有芍藥ナカクサ熟艾トシシヒ无ナシ黃芩于地黄治下血如刺猪

葛氏方治卒下血方

豉一升シキ以水三升ハクサチ漬ヒク煮三沸セム去滓ヒクサチ頓服ヒクサチ汁一升セム

日三冬セム天每服セム輒ヒクサチ溫ヒクサチ

又方豉二升シキ以酒六升ハクサチ合ヒク煮得三升セム服一升セム日三

又方煮香薷イヌエ極令濃セム去滓セム服一升セム日三

又方亂髮ハカガフ如鷄子オホキ大燒ヒク末水服セム之セム不過三セム

又方三指撮ハクサチ塩燒ヒク向東服セム之セム

又方灸兩足ハクサチ父指迴毛中セム退年セム壯即愈セム

僧深方治卒下血補藥散方

甘草一匁 干薑一匁 蒲黃一匁

凡三物下痔漏服方寸匕日三

又方治卒注下并下血一日一夜數十行方

灸齋中及齋下一寸各五十壯今案葛氏方以錢掩齋上灸錢

下除五
十壯

醫門方治平下血或目喫契物而菱方

生薑根汁 生地黄汁 生藕根

汁各飲一升日三卷 又方小豆末和水服

方寸匕日三服立差

范汪方治下血方

干地黄五兩

膠三兩炙

凡二物治ツキ後ハ分ハ

三服葛氏方

又方干地黄下一兩以酒服方寸匕日三

又云治大便秘血諸血衄血方

鳶賊魚骨イカシヨウ五ツキ分

桑耳ハクキ一ツキ分

凡二物治痔漏服方寸匕日三

千金方下血日夜七八十行方

黃連カク四兩

黃蘗布四兩

二味ヨキ淳ハ酢ハ五升ハ煮

取一升半分再服

枕中方治人下血方

取鷄蘘紋チヒヒエ取汁多少任意服之愈今案集驗方治

吐血下血并婦人漏下

新錄方治率下血兼血痔方

支子シナナシ及皮オカラ一升以水三升煮取一升三合分二

服ヨ

又方桃奴モウシネ樹上死桃子カシガレ也取一升以水三升煮取一升

實著樹不落實中煮也

三合分二服

陶景注云
編驗
以程
慶者

又方取敗胎^{フネウツク}如^{ミカド}二升以水三升煮取一升二分二服

又方荆^{ナアエウキ}葉切三升以酒五升煮取一升六合久服

景負及即楚木也

又方赤小豆^{クニ}三升以水五升煮取一升六合汁渴飲

汁飢取豆

又方以水三升煮葱白一升半取一升二合汁分

三服

又云食熱物下血方

鳩生^{ハク}葛^{クハ}根取七八合汁飲之

又方鳩生^{ハク}地黄取汁飲七八合

又方鳩生藕ハナハ取汁飲七八合

又方生蘘荷根ハナハ汁飲六七合

又方酒三升煮大棗オホナツ廿一枚取汁分二三服

又方一水眼石楠皮末方寸匕日二ハナハ

又方鳩ハナハ無問大小猫ネコ帛羊等取汁飲之

並好ヨシ若冬月無生者掘取根或乾者切カキタ

二升以水三升煮取一升二合分二服

治小便不通方第十七

病源論云小便不通者膀胱與腎俱有熱故也腎

本草云大小蘘荷根
止吐衄鼻注云
太蘘荷苗蘘荷是
苗蘘荷方藥不用
又有羊蘘荷

小蘘荷
欲相似
力有殊
毒齊

由本書有之

旁光三音

非虎捕菊

菊生

生平澤

主水膀胱為津液之府此二經為表裏而水行於

小腸入肥者為小便腎與膀胱化熱入於肥化熱氣

大盛故結滯令小便不通

葛氏方治小便不通方

熬イリ塩令熱ユキ內イシ囊中以熨ユセ少腹上

又方以塩滿ヨ膺灸上三炷已上小品方同之

又方未滑石水脹方寸匕

又方以衣中白魚五イシヨ內小孔中

千金方治小便不通方

卷之六

七

水四升洗甌帶取汁煮葵子取二升半分

三服

又方葵子アヲヒ車子オホコ水五升煮取二升半三服

又方鯉魚齒灰末酒服方寸匕日三

鯉魚背也

又方臭頭石末水服方寸匕日三

新録方治小便不通方

水漬石迭ヒヤク慰オホコ少腹下出或燒石アヲヒ慰オホコ少腹

以出為度

又方車前子オホコ二升以水三升煮取一升二合再アヲヒ

服

小品方小便不通及閉格方

取生去根ヒシ檮取汁ヒシ以少水ヒシ解之於筒中
吹フキ內下部即通秘方

又云治小便閉方

豉半升水四升モ煮一沸去滓ヒシ一服立愈ユ通

醫門方療小便不通方

取ヒシ乱ヒシ髮如拳ヒシ火燒ヒシ作灰ヒシ末ヒシ篩ヒシ酒服方寸匕立

愈

又云療小便不通小腹滿悶不急療數人方

葱白チノネ切セ一合塩少許ハナハシ搗ハキ絞ホシ取汁灌イユク三五

豆粒許入水道中水便出極効アタラシカクシヨ

集驗方治淋小便不利陰痛石壽散方

石壽イハナカハ二兩瞿麥オナモミ一兩滑石五兩

車前子オホハコ三兩葵子アヲヒ二兩

凡五物下篩先食服方寸匕日三セヨ

令李方治淋胞滿不得小便滑石散方

滑石一兩通草アヘヒカサ半兩石壽イハナカハ一兩イハナカハ

凡三物治葎酒脹方寸匕日三

范汪方治小便不通方

取陳葵子フルキ一升淳酒三升煮之モチテ脹盡セ

治小便難方第十八

病源論云小便難者此亦是ト云腎與膀胱ト云熱故時忍又 大ハフシロ 旁光三音

故也

錄驗方治小便難淋シツキハリ淋方

通草二兩アケヒカミヲ

茯苓二兩フクハ

亭歷子二兩ハナセリ

葵イ凡三物下篩以水脹方寸匕日三

新錄單方治小便不出腹滿氣急者方

灸關元穴在臍下三寸依年壯

又方車前草切キホハコ三升以水五升煮取二升

分二服日一

又方甌帶コシホラ一枚以水五升煮取一升六合再服

又方大麻子三升以水五升煮麻子腹破ハタコリ分服ホシキキ

又方煮滑石取汁飲之立下トコロ

又方葵子アヒ二升以水四升煮取一升六合分三服

又方第根チノネ切二升煮服依前兼去渴竅妙

醫門方療小便難方

以少塩内莖孔中昂通イシヨ

治小便數方第十九イサタニハル

病洎論云小便數者膀胱ナリタロ脫輿腎俱虛而有容

契乘之故也

范汪方治小便一日一夜數十行方

昌蒲アヤシクセ黃連カクナク二物分等治テ淋瀝テ方寸匕

又方石膏半斤テ吹咀テ以水一斗煮取五升テ

稍脹已上葛氏方同之

千金方治小便利復非淋方

榆白皮二斤水一斗煮取五升服三合日三

又方三年重鵲巢燒末服之

葛氏方治小便卒太數復非淋一日數十過令人

疲瘦方灸兩足下第二指本節第一理七壯

又方不中水猪膏如鷄子者一枚炙菜下取

肥汁盡服之不過三此二方并治遺溺也

又方鷄腸草一把炙燒酒一升漬一時絞去

滓分再服

醫門方療小便數日夜出無節度方

小豆苗藁^{ハキ}檮^{シキリ}統^{ノリ}取汁飲一二升立止極効^{トモニ}

治小便不禁方第廿

病源論云小便不禁者腎氣虛下焦受冷也腎主
主水其氣下通於陰腎虛下焦冷不能溫制其
水液故小便不禁

新錄方治小便不禁方

栢樹白皮切二升以水三升煮取一升二合分

再服相去十里^{ハカリ}

又方故翫帶以水三升ヲキキ蠶取一升二合ヲキキ分二服

又方露蜂房灰オホハナハナ酒服方寸匕日二

又方石楠皮子灰シタノ酒服方寸匕

又方榆白皮ヤシ切二升水四升モ煮取一升六合モ分二服

令李方小便不禁數行方ル

當歸二兩オホセリ

甘草五升

凡二物治下淋オホセリ

服半錢上日三セ一月タモ寒復月內イユヌ伏苓イユ腫痛內黃オホセリ者ヤラシ

分等セ

槿要方療小便不禁或如血色方

麥門冬八兩ハシカ 茯苓子二兩ハシカ 甘草一兩ハシカ

乾薑四兩ハシカ 桂心二兩 干地黄八兩

續斷八分ハシカ 石水一斗ハシカ 煮取二升半分三服

治小便黃赤白黑方第廿一

僧深方治膀胱急契小便黃赤滑石湯方

滑石八兩碎 子苓三兩一名黃芩 車前子一升オホク

葵子一升アツヒ 榆皮四兩ヤニ

凡五物以水七升煮取三升分三服

龍門方療人小便白稠方

取蜂房燒作灰和水一服ハナノル一匕イヌ又老

范汪方治小便利多而或白精從溺後出方

枯樓カラルリ三ハナ分 滑石二イハノカハ分 石棗イハヒ一ハナ分

三物為散麥粥服方寸匕日三モチセ

又云治小便白濁而多方ニ

桑葚ハナキノシタケ三ハナ分 甘草五ハナ分 二物為散以酢アサヒ

漿服方寸匕日三ヨ

又云治虛羸ル沙便ハナ青黃白黑如米汁方

白善ハナ六ハナ分 龍骨ハナホネ五ハナ分 牡蠣シタキ二ハナ分

一名白五

小豆三兩契イヒモクノネ 古薇根二升ヒモクノネ 凡五物治後以酒服

丁方寸匕日三

治小便血方第廿二

病源論云心主於血与小腸合九若心家有熱結於小腸故小便血也

養生方云人食甜酪勿食大酢變為尿血也

新録方治尿血方

車前草オホハナ搗キ紋取汁服五合旦空腹服之ト

又方棘刺二升水四升煮取二升分三服

范汪方治小便澀方

烏芋根クモネ五升クモネ搗取汁服二升

千金方治尿澀方

豉二升クキ酒四升者取一升頓服

又方生大麻根十枚水五升者取二升分三服

又方龍骨タウホネ細末ユエカミ溫酒服方寸匕

又方燔塩アハシ熨少腹并主淋大良

又方刮滑石コケタ屑水クハミ和塗少腹モシ繞陰際ヌリ佳

又方灸大敦穴隨年壯

又云治房損傷中尿血方

牡蠣ウナギノコヒ

車前子オホムシ

桂心

黃苓ヒツキハシハ

四味下萍飲服方寸匕日三加至二匕渠全又

又云治虛勞尿血淋方

葵子アフヒ一升水三升煮取一升半日三

葛氏方治小便血方

第根チノネ一把チノネ切煮去滓數飲之七ノカ丸一アツキニシ

又方楊慈白フイキノネ取汁服一升此

小品方治生地黃湯治小便血方

生地黃半斤

栢葉二把

黃芩二兩

膠二兩

甘草二兩

凡五物以水七升煮

取三升絞去滓

內膠令烊三升半久三服

博濟安衆方療小便出血方

地黃汁一升

薑汁一合

相和頓服未差再

服

治遺尿方第廿三

病源論云遺尿者此由膀胱虛冷不能約於水故也

范汪方治人喜遺尿方

范汪方治人喜遺尿方

永懷又救也一之言物也

防已フシ防風フウフ各三錢ヤフヒ葵子アヲヒ二分治末服方寸匕二方

防已フシ三升サンシヨウ

又方ホシ礬石シカキノカヒ牡蠣シカキノカヒ分等治合以黍粥服方寸匕三

令李方治遺溺夕藥散方

白薇アヲシヲクセ一兩エヒルケルリ夕藥エヒルケルリ一兩 凡二物治合下酢酒

若水服方寸匕日三モデヨ

龍門方治遺尿不禁方

取鷄巢中蓐乳属又蓐也蓐也燒灰服一錢上日三七日イエヌ老イエヌ

今案本草拾遺云水進方寸匕ルメ急主噦セシ

錄驗方治遺尿龍骨散方

桑茸三兩

燧石二兩

牡蠣二兩

龍骨三兩

凡四物合治下淋服方寸匕日三

千金方治遺尿小便澀方

木防已二兩

葵子二兩

防風三兩

三味水五升者取二升半分三服散水服佳

小品方治遺尿灸穴

灸遺道在俠玉泉五穴隨年壯

又方灸陽陵泉陰陵泉隨年壯在膝下寸

治尿淋方第廿四

病源論云人有於眠睡不覺尿出者是其稟質陰
氣偏盛陽氣偏虛者則膀胱腎氣俱冷不能溫制
於水則小便偏多或不禁而遺失

新錄方治尿床方

大麻根皮切三升以水五升煮取一升八合去滓
分二服小兒減之

又方大豆葉三升水五升煮取二升分三服

醫心方卷第十二

光康

醫心方卷第十二背記

白魚

一名蟬音滄
二音覃
和名之鰻
爾雅注云鰻魚也
衣書中目主出也

以上第廿八葉

...

醫心方卷第十二札記

十四頁
上二行

栢樓三雨

千金作栢樓根

三行
粥飲

千金無

六行
相典

病源相
作故

七行
為尿

千金為下
有病字

十五頁
上三行

一錢上日二千金

作方寸匕
日三服

下一行

宿為

病源作
宿病

二行
契則

病源契下
有甚字

如豆

病源如下有
似小二字

十七頁
上七行

芒消湯

千金關格
門無此方

九行
為

柶樹根皮

和名抄云楊氏漢語抄云烏草
樹佐之夫乃岐并色互成說同

廿一行
六

斤
引作六枚

廿二頁
上六行

又方麻油

千金有醬清三升共
三味方後云一方不

用醬

廿八頁
下三行

又方葵子

千金小便不通
門中不收此方

廿四頁
又

方葵鹽

千金此方收
在氣淋門中

九行
又方灸大敦

千金尿血門
中不收此方

胃心方卷第十二札記

世五頁黃荅千金此下有
上二行等凡二字

世六頁防風三雨千金作
下六行各一雨

醫心方卷第十三

從五位下行賊博士兼丹波介丹波宿祢康賴

治虛勞五勞七傷方第一

治虛勞羸瘦方第二

治虛勞夢泄精方第三

治虛勞尿精方第四

治虛勞精血方第五

治虛勞少精方第六

治虛勞不得眠方第七

治昏塞毒眠方第八

治陽虛汗出方第九

治陽虛盜汗方第十

治耶傷汗血方第十一

治傳屍病方第十二

治骨蒸病方第十三

治肺痿病方第十四

治虛勞五勞七傷方第一

病源論云虛勞者五勞六極七傷是也五勞者一日

筋及瘦損云云

志勞二日思勞三日心勞四日憂勞五日瘦勞又曰

筋注於筋骨外筋骨也俗作筋

五藏勞也六極者一日氣極二血極三筋極四骨

肌息多憂中筋也

極五髓極六精極也七傷者一陰寒二陰萎三裏急

於為多虛云

急於新

武玄補也

四精連之五精少陰下濕六精清七小便苦數臨事不

此五藏之居寒冬藏也足居冬小感也苦以冬藏也

畢又曰脾傷肝傷腎傷肺傷心傷形傷志傷

今案虛勞陰痿

方在廿

八卷

千金方云三人九子丸主五勞七傷補益方

勞病源論
五肌極也

酸乘人オナメ又ルキナツカヘラフ 栢子人オシクア 薏苡人クコ又ヌクモ 地床子ヒルカシロ 五味子セネカワラ

菟糸子オナシクモ 菊子ヒナミ 薺蘭子ヒナミエーヌハコ 荊子ヌアク丸ネ 地膚子ヒキクモ又ニハモ 烏麻子ヲコア

署預ヤテライモ 桂心ヤテライモ 子地黃

十五味加粳容三兩餘各二兩酒服セラ如梧子廿九日二フクハヒ

范汪方開心署預腎腎氣丸治大夫五勞七傷髓極不耐シチタヘ

寒眠昂臚諸其冬在傳將食腹如廁痛也張心滿雷鳴不欲飲食心下停淡不能

消春夏手足煩久契秋冬雨脚凌久クウカニ冷虛多忘腎氣アチ

不行陰陽不發絕久如老人服之健中補髓填虛アチ養志開心

安藏上渡明目寬胃益陰陽除風去冷无所不治云

禹貴及四月者脾二符也

方

寢容一兩

山茱萸一兩カサハク又イワナハカ

干地黄六分一方代

遠志六分丁ツボト又丁ツフクリ

地床子五分ヒルシロ

五味子六分ヒネカツラ

防風六分ハニカナ又ヒタナ

茯苓六分

牛膝六分ヒナクツチ

菟糸子六分ネナシクセ

杜仲六分ハヒアト又シトヤ

署預六分ヤアライモ

凡十二物ツチ下篩フルヒチ蜜丸ハチ如梧子フモ服十九至廿九日ヒル

二夜ヒル一若煩心即停減之只服十九為度服藥五日

莖熾シ熱チハル十夜チハル通體滑澤ナリ十五夜ナリ顏色澤ハルヒ半足アタマ熱ヒル

廿夜チハル雄力欲盛チハル廿五夜チハル經脉丸滿チハル廿夜チハル熱氣朗徹チハル

面色如花手文如チハル繇チハル血心開チハル記事不忘去愁止チハル癰チハル

息寸及澤水也又作澤

大素經云
天有十日
人各有十
指辰有十
二是有十
指莖垂二
以應之女
子有陰而
不足二莖
故得懷子
今案莖垂
者玉莖陰

オホキニ礼

夜不寒止尿洪陰年卅以下一刮即足五十以上

兩刮即足滿七十有子婦人斷續者服一刮

丁子ニ

五十得子无所禁但忌大辛酢

カラク
ルキモノ

似是及鏈也

又玄六生散治五勞七傷五緩六急治寒熱脹滿大

腹中風垂曳消微逐血補諸不足令人肥白方

垂曳也漢秋列及漏世泄又作洩

生地黃根二斤 生薑二斤 生昌蒲根一斤

アヤメクセムアクセ

生苟杞根一斤 生烏頭一斤 生章陸根一斤

イブ礼キ

凡六物合七斤熟洗之傳令煖粗切之美酒二斗都

合漬三四日出爆之暮輒還署酒中趣令汁盡

シメテ

心搏末下凝滯服半錢上日三十日之後增至

一錢以試有驗

煎藥方玄蘓蜜煎治諸渴及內補方凡

蘓一升 蜜一升 地黃煎一升 甘葛煎一升 大棗ナツメ煎オホナツメ

伏苓フツホト 人參 署預各三兩

石八物先蜜蘓入合攪カフニクセヌニコタヌクハライタラハシ洋後トイテ耳葛煎入洋棗膏了絶了キタ

絞シホリ入然後伏苓人參署預等散入合後入地黃煎

微火モチ煎不心手攪カキヒヤル之

今案蘓蜜煎方有數首或藥種多少不同或

分兩升合各異ナリ仍取當今名醫增損之法以備

俗用藥種如左

藕小一升

蜜小一升

煎去滓沫元
用甘草煎

甘草煎大三升

地黃煎大二合五夕

麥門冬煎大二合五夕

生薑大

五升

春絞莢得
大五合

大棗

百五十枚

取肉

練胡麻大三合

葵春

干署預小三兩

春篩

伏苓小二兩

春篩

凡十物先以藕入生薑煎之令相得次入

蜜次以甘草煎和大棗練胡麻絞去滓入

次入干署預伏苓次入麥門冬煎地黃煎

瘕

翳

皆入諸藥微火上剪不離手攪令分タ和調

至翳尾オロル不火点不心手攪冷之但或方如集

大服二九日三或如鷄子大服一九日三令之

多少任意入酒服之

雜酒ミ方檇石決明酒治シチ除腰脚疾 アクシタシタア病癰諸風痺惡

血去目七ノ白膚ヒ翳赤膜痛丁ノ眩眩側冷及目動也爰セシロキヲ書セシロキヲ瞽セシロキヲ盲セシロキヲ輕身補腎セシロキヲ

氣和百草シ好顏色タクシ延壽タクシ肥健タクシ長變方タクシ

石決明アハレ朝乾者一大斤洗多蜀杞根白皮小一斤

右二物コナカ細切コナカ盛盛絹盛憾盛以清酒四斗五升漬之春

至及脚冷濕病

五日夏三日秋七日冬十日去滓ウカハ始服多少ウカハ不白占

大清經五ムコキ茄酒治五勞七傷心痛血氣乏弱男子陰痿

不起サキ囊下恒濕フクリツヒタツネ小便餘瀝ウルヒ而陰痒カカリ及腰脊痛兩

脚疼痺風弱五緩六急虛羸ヒナキ ヒルア補中益精堅筋

骨强志意久服輕身耐老耳目聰明タヘ落齒更生オチタハ自駿オヒ

更黑身躄輕强顏色悅澤治婦人產後餘疾百病ナリ

常用雄不用雌之五葉者雄之三葉者雌之雄者

味甘雌者味苦ニカシ夏用莖葉冬用根皮切一升盛絹

袋袋以酒一斗漬春秋七日夏五日冬十日去滓溫服

任意勿^レ醉此藥禁物但死尸并^チ產婦勿見也日食

五茹不用黃金百庫也賀蘭方苟把^ヲ剪主^シ五内耶氣

契中消渴周痺風濕^ヲ脗腹^ヲ遊^游氣客契頭痛內傷

大勢虛損頭面遊風々頭眼眩五^ク瘥^ス脚弱痿四^カ支^ハ拘

攣^カ膝^メ痛不可屈申傷中少氣陰消^ヲ胎^ヲ疼^ヲ憂^ヲ患^ヲ驚

耶^カ忍^全悸^及心^心下結痛煩滿^イ欬^タ逆^ハ口^フ焦^キ舌^チ乾^ツ好^キ唾^ハ掌

中^コ淡^ハ水^ハ腫^其陰^季下^及痒^心濕^動小便餘瀝^カ脚^エ中^ル酸^カ痛^リ不^ハ欲^シ

踐地身中不^フ乏^キ四^マ支^チ沈^カ重^キ時^ハ行^キ臨^マ蹠^チ折^ク跌^レ絕^ア筋^ナ積^ル

聚五勞七傷目暗^ク清^ア盲^キ熱^シ赤^セ痛^ム補^フ虛^ヲ羸^ヲ除^ク寒^ヲ

宋作膈胃
膈

勢益氣力長肌肉心腰痛充五藏利小便益精氣
止洩精之服耳目聰明陰氣長強堅筋骨鎮脾
髓養神安魂安魂令人身輕能跳越峯谷不老
而長生也

苟杞根切大一石以水大三斛入煮取五斗汁去

滓加暑預藕根各二大升煮取一大斗次

牛膝伏苓石斛杜仲各大一斤以水五斗煮大

取一大斗次茅根蘆根各大一斗以水一斛煮

取一斗加棗膏大一升煮取令減半混合三

汁煎令減カ三之二カ次加地黃ヤ煎大アル二升ハ麥門ハ

冬煎大ア二升ツ次加蜜大ア一升ハ千歲ア葛汁ツ煎矣

二升冬時ヤウヤク藕大ア二升ハ稍煎令如糖アメトシメテ傳イ冷納シ凍

器密封始服如彈丸大今案加生薑汁一九日三ハ煎五合

歸驗方生地黃煎補虛除タル熱ハ將和取利也即良又送也行也助也散石癰疽

瘡癰カタネ痔子熱皆宜之方

生地黃根隨多少練裁春絞取汁復重練裁春絞取之盡シテ

其汁乃ハ除去ハ滓也ハ以新布重絞其汁去カ滓ハ碎クダナ

濁令清淨ニユリ量銚中量ハ釜湯上煮ハ銚勿塞ニシ全アセキ

銚可引見
溫器也
七丸ナハ

邊令湯氣得泄不沓也煎地黃汁竭減半許

後煎下更以新布絞去滓碎結濁滓穢去復煎

竭之令如飴糖成煎北方地黃肥味濃作煎

甘義東南地黃堅細味薄作煎誠苦不美

然為治同耳能多作則美好也少作則易竭

苦々不美然少作不可減三升汁

治虛勞羸瘦方第二

病源論云夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人

精髓萎竭血氣虛弱不能充盛肌膚故羸瘦也

録驗方苟杞丸治勞傷虛損方

凡下口クモアノ口クモ

苟杞子三升干地黄切一升天門冬切一升

凡三物細搗曝令干以絹羅之蜜和作丸

大如彈丸二服

范汪方云補養湯主虛勞羸瘦食已少氣方

甘草一兩炙木四兩牡蠣二兩大棗廿枚阿膠三

兩麦門冬四兩凡六物吹咀水八升煮取二升盡服禁

生冷

千金方甘草湯主虛羸氣欲絕方

吹咀
煎樹之
義又云
切皆應細

甘草二兩 生薑二兩 人參二兩 五味二兩 葶藶二兩 吳茱萸二兩

五味水四升 煮藥莫甘令如蟹目沸去滓內藥

莫取一升六合分再服

又云小麻骨剪主治一切虛羸皆患服之方

麻骨一具 芎杞根切一升 二味各以水一斗別器

煎各取汁五升去澤瀉乃合一器共煎取五

升二日服盡好將須用大升

本草拾遺云鯽魚肉主虛羸熱者食之

耆婆方治人瘦令人肥健肥自能行陰陽并去風冷虛

瘦無力神驗方

取楓木フカツラ經五年ヘタル以上樹皮去上里皮取中白皮五

斗コトカ細剉ツイカ微曝ヒコシ令水氣去ヘクシチ以清養酒ヒ於白瓦器

中漬ヒタレ之依春夏ヒナシ七日秋冬ヒナシ二七日少飲酒ヒナシ

飲盡ヒナシ至下ヒナシ似如楓膠ヒナシ少ヒナシ取食ヒナシ之ヒナシ不經數月ヒナシ

昂肥ヒナシ白立驗ヒナシ忌如法ヒナシ

搗要方ヒナシ去苟杞子ヒナシ消療ヒナシ羸羸ヒナシ黃瘦ヒナシ不能食ヒナシ脹之ヒナシ不過ヒナシ

兩割ヒナシ必得肥ヒナシ充ヒナシ無禁ヒナシ新方ヒナシ

苟杞子ヒナシ五大升ヒナシ乾者ヒナシ碎ヒナシ生地黄ヒナシ三大升ヒナシ切ヒナシ大麻子ヒナシ五大升ヒナシ碎ヒナシ

極ヒナシ無及ヒナシ生音ヒナシ主之上聲也ヒナシ救也助也ヒナシ

石於甑中コキ蒸麻子カハフイヒナ使シ熨セ下署セオロシ按上攤イ去セ熱氣登及按也他書及用也

冷暖如人肌内地黃芍杞子カハフイヒナ就シ按使三物相得

內絕イレ代衣中以無灰清酒アツ二大斗浸之ヒタス春夏五

秋冬七日取服任性多少常使體中微有酒ルコシ

氣

明堂經云脾輸二穴灸三壯主腹中氣脹アリ引脊痛サセ食

飲多身羸ルシトモ瘦名曰食晦注云晦月盡謂陰氣盡陽セテ

氣盛所以消食羸瘦ル

治虛勞夢泄精方第三

卷之三

病源論云腎虛為耶ル所乘耶客於陰則夢交接令

腎虛弱不能制於精故曰夢感動而泄精

小品方別離散治男女風耶男夢見女々夢見男

悲愁憂於避又怒恨也恚怒喜無常或半年或數月日復發者方

楊上寄生フツクケ三兩オヤ木メケラ三兩桂心一方一兩ニツシヤ首芋メカマシ一

兩天雄ラウ一兩オヤサナハシ許根アチラ一兩オヤ荊根キョウシ昌蒲アヤナ一兩メカマシ

附子オウ一兩オヤ于薑クレハシ一兩オヤ

九十物合搗下投酒服平方寸ニ日三合ニハ藥勿令

婦人鷄犬見之又无令見病者々々家人見令

アヤナメカマシメカマシメカマシ

藥ル知藥者令耶氣不去禁之為驗ナレ

又云龍骨散治男子失精百術モ不治方

龍骨タツノホネ大如指アタリ赤理アカリ錦文者ウ薑薑草二兩本草薑草甘无毒桂肉二兩

干薑二兩 凡四物下莖酒脹方寸匕日三神良

又云テス蕤子湯治失精方

蕤子コアラ一升タツノホネ龍骨三兩 赤石脂三兩

凡三物以水七升煮取二升半分三服

集驗方治夢泄精方

蕤子葵一升 一物搗篩酒脹一方寸匕日再神効

本草云
蕤子タツノホネ
蕤コアラ
宋韻云蕤
胡介子章
芸菜芸葉似
蕤也
非音久俗
作蕤蕤又
云芸菜名也
一種而久者
故謂之蕤菜

取在二之上
一地也

醫門方療夢交接泄精暫睡即出身體枯^{カシ}脊骨立者方^{カキ}

白龍骨八分^研 蕪子一升半 為散^{セウ}酒服方寸匕日二

加至一匕半日二

操要方云小便失精及夜夢洩精方

蕪子一升^{コハナ} 麥門冬^{イム}二兩^{ヤブハコ} 菟糸子二合^{オホハコ} 車前子二合

龍骨二兩^{オムナカハクセ}

^{本草云五升五匙ヨリクセ順和名オホカワラ香草也}

已上以水八升煮取二升為四服日三

玉房秘決云治數夢交接失精方

龍骨 牡蠣 甘草 桂^{各三升} 大棗二枚

水六升煮取二升半分三服

僧深方云禁精湯主失精羸瘦酸消少氣視不明

惡聞人聲方

並子二升

ナテシキウシホヌルダウチネ生粳米一升

二物合於器中熬之米黃

クロク下チカク黑及粳急以淳佳酒一斗投之絞ル取七升服一

升日三劑便愈

新錄方治失精方

取薤根搗取汁服五合日二

又方石栲皮搗為散モ飲服方寸匕日二

又方葦子一升クハキイフイホムトコ又オホキカクイ桑螵蛸モテ十四枚モテ水五升モテ煮取二升

三服之為散酒服

葛氏方云治男氣女夢與人交接精便泄出此內虛積

滯耶氣感葭治之方

葦子一升ツルシネ粳米一升ツルシネ水四升モ煮取落室丸升半一服

又方龍骨二分ツルシネ朮四分ツルシネ桂二分ツルシネ天雄一分ツルシネ搗末酒

服五分ツルシネ日三

又方南足內踝上二夫ツルシネ服上名三陰交灸廿一忙夢

昂新

又方合手掌并大母指令药气相近以一至灸

灸药際角令半入气上三炷

又云治男妇精平常自书或闻见所好感动便已發此腎氣之少不能禁制方

巴戟天

石斛

黄耆

分等

捣酒服方寸匕日三

又方

鹿茸

二兩桂尺

薤子

二升附子

二枚

澤馬

三兩

捣末

服五分

日三

又方

鹿茸

一兩

桂尺

薤子

二升

附子

一枚

兩

又方

牡丹

炙令

變色

捣末

服

寸日三

又方雄鷄肝鯉魚膽令溼陰頭

治虛勞尿精方ナリニ第四

病源論云腎藏精而氣通於陰勞傷腎虛不能藏

於精故目小便而精液出

千金方治虛勞尿精方

薤子或本薤一升 稻米二升 水一斗七升モ煮如粥取汁

六升一分三服

葛氏方治男子溺精如米汁及小便前後去精如鼻涕或溺有餘瀝汚衣此皆內傷令人虛絕治之方

栝樓二分

滑石二分

石華一分イシノカハナチ又イハカシ又イハシ

搗末以麦粥服方

寸匕

又方甘草 赤石脂八分 葶苈末 服方寸匕 日三

腎門方 玄療失精無故自泄コト或曰尿精モリ方

韭子白龍骨 鬼系子

各二分

麦門冬ルツナカヲ

去心オホコ車前子

澤馬ヒナアヒ又オモタカ

各十二分

人參十分

石田黃八分シラヘホ又上ホ

為散空腹以酒服方寸匕 日二 加至一匕半

録驗方 淮南王枕中丸 治陰氣裏腰痛 兩胫脣疼イタ縁又

小便多瀝失精 自書囊下濕癢方フタクリ

石斛イハク

巴戟天ヤチヒン

桑螵蛸クハキツオホキ

杜仲ハヒト

アヌシト

凡四物分等合アハセ搗下オロシ蔞蜜丸如梧子涌脹十

九日二令強陰氣充補諸虛討神良

治虛勞精血出方第五

病源論云腎藏精之者血之所成也虛遷勞則生七傷六

挫氣血俱損腎家偏虛不能藏精故精血俱出

葛氏方云治失精之中有血方

父蛾ツヒル二七枚カノ陰子イハ之玄セ參シ稱カ半ノ分ノ合ノ搗末以米汁

向且日一服令盡之

稱俗作秤昌乃及正斤兩也

治虛勞少精方第六

千金方治虛勞少精方

廉角曰未蜜和服如梧子七丸日三卅日大効

又方生地黃根五升以清酒漬少々飲之

又方漿コムツ又ツクリアツ煮薤葉ハジヒシ令熟洗陰日二十日知

雜酒方云桑樹東南枝白皮一把ヨウ勇細切以酒一升漬之

經宿去來皮多少飲之精如湧泉

未ク

治虛勞不得眠方第七

病源論云耶氣客於藏府則衛氣獨營其外行於陽

不得入於陰行於陽則陽氣盛居安ヲ驕也則陽蹇滿不

得入於陰氣虛故目不眠得

千金方云千里水湯治虛煩不眠方

ホツクアヌカクキウア

ヤハフモナウラネ

エツホトヌツクリ

ヲナツメヌルナツメ

半夏三兩秫米一升伏苓四兩ヤルル酸棗二升ヤルル麥門冬

三兩甘草二兩桂心二兩黃芩二兩遠志二兩オニトコロ

草解二兩人參二兩生薑四兩十二味オニトコロ以千里水

一石煮米令蟹沸オニトコロ揚之乃過漚取清一斗煮諸

藥取二升中三服分テ

又方療虛勞不得眠方

酸棗^{ヲナツタスルキナク} 榆葉^{ニシテハ} 分等丸如梧子一服五丸

又方耒子薑四兩湯和頓服覆取汗愈^{キヌオホフテ}

又云酸棗湯主虛勞煩擾奔^氣在胸中不得眠方

酸棗五升 人參二兩 石膏^{シライシ}四兩 伏苓^苓三兩 樗^{桂心}二兩

生薑二兩 甘草一兩半 知母^{ヤマトコロヌイトコロ}三兩

八味以水一斗先煮酸棗取七升去棗內餘藥煎^{イシラ}

取三升分三服

葛氏方云治平苦連時不得眠方

暮以新布火炙熨目并裏大豆囊盛枕之^{アフリ}之^{ハシ}之^{フクロ}之^{イクラニルヒエハ}之^{ヒエハ}復

易終夜常枕立愈カヘリ
下ウラハル
イ

崔禹錫食經云螭治夜不眠志意不定蟬
秋タチ
トコロ

本草經陶景注云榆初生葉人以作糜羹羹
アツモウ革令人

睡眠愁公所謂榆令人眠トモモナリ
ラ

小品方流水湯至虛煩不能眠方

半夏二兩ホソクア
ヌカクホクア
洗
アハモナラフネ秫米一升 伏苓四兩本マ

凡三物以流水二斗揚之三升過令勞煮三物得

五升分服一升日三夜再

意
コウシテ

僧深方小酸棗湯治虛勞虛羸不得眠煩不安

方

本草云
知母一名蜚

母

宋韻云是
母即知母草
也其音是
文及

酸棗二升 蜚母二兩 干薑二兩 甘草二兩 伏苓二兩

ヤイトコロ

苓

芍薬二兩 凡六物切以水一斗煮棗減三升分三服

治昏塞喜眠方第八

コノムチ

病源論云嗜眠者由人有腸胃大皮膚溢者則引

シクイ

肉不用解其氣行在於陰而遲留其陽氣不精神

同月

爽昏塞故令嗜眠

葛氏方治嗜眠喜睡方

父鼯目一枚燒作屑コクツ實膏和注目外ツクシ背則不肯

ヲネハス

コクツ

ツクシ

アサリ

眠兼又取兩目絳帛裏帶之

又方麻黃木各五分甘草三分日中向南搗末食

後服方寸匕日三

又方孔公薩子末五兩通草三兩茗菜一斤

本草云孔公薩子味辛溫有毒今鍾乳床也

水一斗煮取五升向暮服之即一夕不睡眠

龍門方療嗜睡眠方

馬頭骨燒作灰服方寸匕日三夜一老

今葉陶潛方馬駿燒

作灰末服方寸匕令人不睡眠

又方苦參三兩木二兩大黃一兩搗末蜜丸如梧子

莫過及草名今雅云茶樹小似杷子冬生葉可煮作茶飲今呼早茶者為茶晚取者為茗一名萍蜀一名苦茶風土記云萍者老葉名也

每食後服卅九驗

治耶傷汗アセチル血方第十三九

自此以下篇立与端目錄相違仍直單

病源論云肝藏血心之液為汗言肝心俱傷於耶故

血從膚腠而出也金匱要略

腎門方治汗血吐血方

青竹茹竹青皮也三兩 生地黃五兩 人參二兩 桔梗一兩

芎藭二兩 當歸一兩 桂心一兩 甘草二兩 炙アリソヒマキ

右切以水九升煮取三升去滓分溫三服甚神効

小品方治吐血汗血大小便血竹茹湯方

竹茹二升 甘草六分 當歸六分 芎藭六分 黃芩

イヒク丸リ又ニ此丸又ニ此丸

六分 桂心二兩 木一兩 人參二兩 夕藥一兩

又ニ此丸

凡九物以水一斗煮取三升分四服

治虛汗方第十

胃膝

病源論云諸陽主表在於腠理之間若陽氣偏

虛則津液發泄故為汗則損於心之液為汗故也

小品方治汗出如水漿及汗血衄血吐血小便血治

死都梁香散方

都梁香二兩 紫莞二兩 桂心二兩 人參二兩 生竹茹二兩

考病源論
云虛汗
候

端篇目陽虛汗出

九

シナト丸ル

今チ

作チ

治多野銷也

肉漿容二兩 于地黃二兩 凡七物治節以水服方寸

上

千金方治汗書方致一升酒并漬三日脹之不過三劑老

半治卒无妄

范汪方治汗粉藥方

發背有之

牡蠣二兩 干薑二兩 附子二兩 炮

凡三物搗下以藥一合白粉二合和合摩汗書處

僧深方治大虛汗書欲死若自汗出不止方

麻黃根二兩

凡一物以清酒三升微火煮得二升五合去滓盡服

之

効驗方治人汗勞不止麻黃丸方

麻黃根マナナ二分 石膏一分

凡二物治治肺和蜜丸大人服小豆三九日三小兒

以意增損礼

録驗方治極下汗出作瘡方

蘗皮キハタ三兩 黃連ヒクセツ三兩 甘草三兩 米粉四兩

凡四物治蘗成粉汗出時粉之

又云心汗石膏散方 石膏四兩 甘草四兩 合搗先食

將水服方_寸日三

陶景本草注云麻黃茸及根復月雜粉用之

或本不取二篇相具虛汗

治風汗方_寸第十一

直利又密也

經云凡熱者欲汗_{イタセム}出為通氣也_{一セムカ}而皮膚緻密不汗出

也風者欲汗_{イタセ}不出為身疲也而皮膚踈薄汗出不止

范汪方治風汗出方

防風_{今ニカサ又九カナ}二兩 牡蠣_{シカキ一ツカヒ}二兩 乾薑_{クレハハヒカサ}二兩

凡三物_右治瘧一升自粉三升合攪_{カイチ}以粉之欲粉時

於銅甌中_{七シテハ俗セリナ又チヤ}熱令小溫良

僧深方治風汗出少氣方

防風十斤

方風

一方三兩

白朮六分

一方三友

牝
癘
云

一方二面

厲

凡三物治瘧以酒服方寸匕日三

治

治盜汗方第十三

陽虛

ヒソカニアセアル

子

ヒヤコキアセ

病源論云盜汗者目睡眠而身體流汗也此由陽虛所致久不已令人羸瘦

考病論云令谷羸者枯瘦心氣不足巨津液故也

所致久不已令人羸瘦

テ
母

千金方牡蠣散治卧即盜汗頭痛方

牝馬三疋イノ藝イノ術三疋防風三疋

冬イル

方風三而

右三味酒服方寸匕日一三次汗之驗無失於此

切泄汗皆愈

字治本无童其有之

錄驗方心汗石膏散方 石膏四两甘草四两合槌篩

先食漿服方寸匕日三

搗要方療盜汗方

麻黄三两牡蠣粉二兩 蒺藜子二兩 熟米粉半兩

白米粉六分已上為粉生絹袋盛卧汗出傳之

字治本无

范汪方治盜汗麻黄散方

麻黄根三分 故敗扇燒屑一分

凡二物治篩以乳服三分匕日三大人方寸匕日三

醫心方卷十三

治傳屍病方第十三

尸在床曰屍

玄感傳屍方云夫傳屍之病為蠹窠深大較男夫

當尸及丁コトニシオホム不

多以眩痺及勞損為根女人乃曰血氣或注為本

ナ痺腹病也

モア

然比見患者百有餘人得狀不同為療亦異

ナリ

形假既眾名号又殊所以然者中華通曰傳屍蜀

倣

オホウシ

ナリ

ナ

シカル

土都名瘦病江左稱為轉注野俗謂之伏練下里

ルベ

名為淹淙小嬰乃日無羣曰虛損得名為勞極骨

エラ孫ヲ

兒

シハヤル

方武及肺脂也

中契者方為骨蒸痲軟者稱日肺痿神鬼為宗

名之溪連

云々

痿力朱及曲脊也

玉篇云
殭又作殭
殭殭病也
上於劫又
下余攝又
宋韻云殭
殭不動也

病源論云
注病世論
凡注之言
住也謂邪
氣居住身
肉故名注

オホホネ

又云論曰大都男女傳屍之惟心胃滿悶背臂煩補名又試之肩也

疼兩目精明ヒセ四肢無力ハキ雅知欲卧ヒシタク睡恒不嗜脊痛セホ

急痛膝胫酸疼多卧ヒセ小起狀似ヒシタク佯病每至且起ヒセ

即精神好欲似无病ヒセ從日午以後即四體疲熱面ヒセ

好顏色不喜見人過常懷忿恚ヒセ纔不稱意即ヒセ

欲嗔怒行立脚弱ヒセ夜卧盜汗ヒセ夢為鬼交ヒセ或見ヒセ

見先ヒセ或多驚悸ヒセ有時氣氣急ヒセ有時欬嗽ヒセ雅思ヒセ

想飲食而不能多ヒセ飡死在須臾而精神尚好雨ヒセ

助ヒセ虛助虛脹ヒセ或時敎痢鼻口乾燥垣多黏唾有時ヒセ

腹滿也

脣赤有特欲睡漸就沉羸猶如水涸莫不覺其死矣

又云論曰傳屍之疾本起作無端莫問老少男女
皆有斯疾大都此病相尅而生先ツ內傳毒氣周
遍五藏漸就羸瘦至ル於死之訖復易親一人故曰
傳屍亦名轉注以其初得半卧半起号殭殭ヲ內傳

五藏名之伏練不解療者乃至歲問ヤトハ假如男子

曰虛損得之名為勞極

吳楚云淋瀝也
蜀云勞瘁也

其源先從腎起

腎初受氣兩脛酸疼腰脊拘急行立脚弱食飲少

鐵容反
心動不定
驚也
連也

兩耳聾南達反欲似風聲ハ夜卧夢洩モラシ陰沛痿弱腎既

受已次傳於心許及反内息也初受氣夜卧心驚或多忪悸懸

乏氣吸義及反短氣也欲盡夢見先巨有時盜汗食无滋味胃

生瘡心恒煩熱ナ准欲眠卧朝輕夕重兩頰口唇皆

皆患紅赤手足五心亦皆熱心既受已次傳於肺フクハシ

初受氣有時欬咳軟氣微弱有時喘氣卧更甚

鼻口乾燥カハシ不聞香臭カハ假令得聞ウレトモ唯覺セトル朽腐物

氣時惡心憤扶粉反滿也欲吐肌膚枯燥カシ或時刺痛イタシ或似虫

行乾皮細起狀如起行肺既受已次傳於肝キモ

初受氣雨目漠漠目不明之良面无面色常欲頻眉視不及

遠目恒乾涩又時赤痛アカアイタシ或復精黃終キハフチ曹臺欲合眼莫中及目不明也

及好卧睡還不者肝既受已次傳於脾ウコシ初受氣赤冷及

雨脇膚脹食不消化又又時渴利赤冷及糞食生出有時眩眩ヒチ

痛腹イタウ雷鳴腸唇舌雄乾カキ或生瘡腫ハ毛髮イラタ堅无有

光聞或得上氣モク擗肩喘息之龍又利赤黑汁シルアリ至此復者

将死之證也

又云傳屍骨莖伏練殮絲相染滅門神秘方

其胡れ、セリ、ハ、ア、カナ
紫胡三兩 桑根白皮五兩 甘草二兩 桑 桔梗三兩

續新

三兩

紫苑四兩

赤小豆一升

小

青竹茹三兩

五味子三兩

于地黃五兩

死者以生十兩代之

若勢更加石膏三兩

未

若不下食更加生麥門冬二兩

去心

凡九物切以水九升煮取二升五合

浸去滓分溫三服

去

如人行七八里重者服五六劑輕者兩三

劑備五六日一服忌如藥法

又云主傳屍骨蒸

例多盜汗粉身方

麻黃根三兩

牡蠣粉三兩

薤白子二兩 乾朱沙

半兩 未

白朮粉六分

胡鵠脂一兩

凡六味搗篩絹袋子盛之フクロ夜卧汗出傳之ツケタ

又云主傳屍骨蒸鬼氣寒壯熱諸風虛疥癬搔カキ

痒痒カカサ方

直用桃柳槐ソクドク荊藿ツクドク四種枝葉各剉一大升ツバイチ以水

九斗煮取五大斗去滓加塩二大升浸之浸

又云主傳屍伏瘕瘕孫骨蒸於急又身愛也癰鬼氣惡寒悒或

如瘰癧中九エヤア等灸之方未ラハヤア

大椎上穴又兩傍蠡下少許對推節間各相去寸

半二穴神機又名大梯魯得久柳骨也又雨助下名章門二穴又當心背骨

上雨傍各相去一寸二穴夕此个示不

合七穴日別取正午各灸七壯滿一百五十壯早覺漸

老

又玄主傳屍殮孫喜厭夢者灸高丘二穴一琰又在足內踝下微前二陷者中灸七壯老也

廣濟方療瘦病伏諫諸鬼氣惡注朱砂丸方

光明朱砂一大兩碎桃人七十枚モツ七ネ去皮注者痛也麝香三分碎

石研朱砂キリ麝香令細末後用桃人香砂為丸力驗及取像也又良母及收也

如其和不鍛モシ以蜜少許合成訖清飲服一七丸

宇治本无三有本无三

日二服夜一服不痢忌雜肉及辛トラキヲ

又云療傳屍骨蒸掩孫肺萎症忤鬼氣卒心

痛霍亂吐痢特氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘧血

月閉瘰癧丁腫驚痛鬼忤中人吐乳狐狸吃力

伽丸方

吃力伽白朮是光明砂研麝香當門子訶梨勒皮香

附子沉香重者青木香丁子香安息香檀香畢

撥波斯犀角已上各一兩薰陸香蘇合香龍腦香已上各半兩

石研搏篩極細白蜜前志沫和為丸每朝取

并華水服如梧子四九於淨器中研破服之老少
每研一九服之仍取一九如彈丸蠟紙裏非
袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不
傳冷水煖水臨時斟量忌五辛臘月合之
有神藏於壺器中勿令洩氣神効

治骨蒸病方第十四

蒸字及血理也

病源論云夫蒸病有五曰骨蒸二曰脉蒸三日皮

蒸四曰肉蒸五日內蒸

補天及胞胎也

腦按樹及頭腦也相背背及骨髓也

又云有廿三蒸一胞蒸二玉房蒸三胞蒸四髓蒸五

骨蒸六筋蒸七血蒸八脉蒸九肝蒸十心蒸十一脾

是方及金藏也

是日及金藏也

旁光二音腹中水也

都取及肝之府也

蒸十二肺蒸十三腎蒸十四膀胱蒸十五膽蒸十

フク

ムラト

上ハリフクロ

方集人有三瞳上中下也

六胃蒸十七小腸蒸十八大腸蒸十九上瞳中瞳

高貴及白虎通云胃者脾之符

ホソホソ

オホハラホタ

アヲホタ

廿肉蒸廿一膚蒸廿二皮蒸廿三氣蒸云々

ハタヘ

玄感傳屍方云論曰凡人唯知有骨蒸名而不知

必有心腎等蒸云々

又云五蒸病者附骨毒之氣療之通用生地黃汁

不限日數此方神驗云々

又云日骨蒸者其根在腎且起體涼日晚即契

寢

煩躁不寐寢妄食无味小便黃赤急煩亂細喘而

元氣腰疼兩足逆冷冷手心常熱至盛過傷內

病源論云

即變為甘食人五藏若大便澀者与芒消一二三

云人有者

日服乃亦可搗苦參為散蜜和丸如梧子大一

動腸胃間

服七九日再服无所禁忌以身輕冷凉冷能食為

侵食府

度

藏此猶是

二日脉差其根在心日增煩悶莫困及溲也擲手如肺喻合思

也但虫因

水口唾即浪言或驚恐不安脉數若蓬盛之時

甘而動故

變為寸病各下悶或暴利不能止若利方

名之為疳

變為寸各下悶或暴利不能止若利方

疳宋居韻

也病

苦作區

女力及虫食

許及及肉息也吸字同

寒熱良

苦參二兩クラハ青箱二兩ウチセクヌアデセクヌシデセクヒモキ艾葉一兩甘草兩カク切以

水四升煮取升半分爲二分羊脂中盛灌下部ソク

若不利服芒消方寸匕本草云味辛大寒出太宰倫中

三日皮逐其根在肺必大喘鼻乾口中无水上白小

便赤如血蒸感之時胃滿或自稱得注熱雨脇下

脹大嗽徹背連脾ヒミラク痰眠イヌル寐不安或逐毒傷藏口内注病名見上

唾面急与芒消一兩日不過三服之訖冷水浸手以ヒタシテ

熨脇間及臍上カクハラホネ白下第三脇間下臍下空中七壯

灸之カクハラホネ

四日肉亟其根在脾體熱如火煩躁无汗心腹鼓脹

食即欲嘔ハセムト小便如血大便秘ナリ混濁盛之時或體腫目赤

不能安寐者宜取大黃一兩半切以如小豆以水一升

浸經一宿明經取汁一服五合許微下昂上若熱

不定亦服芒消一匕日二服任意以涼為度

五日肉亟亦名血亟所以名肉亟者必外寒而內熱

把手附骨而肉契其根在五藏六府其人必困患

後得之骨肉自消飲食无味或皮燔而无光澤

盛之時四支漸細足跌腫起宜搗石膏十兩為一

剖細研如鍾乳法和水一服方寸匕日再服為佳

涼為度上件五逆患困特患愈後食羊肉皮肥臍

或酒或房而得久逆不除終變為甘必須先防

下部不得忍之

又云主夫目虛勞損夢洩盜汗小便餘瀝陰濕弱

欲成骨蒸者名曰勞極黃耆大補腎湯方

黃耆三兩生薑三兩人參三兩大棗廿枚

二兩芍藥三兩桂心三兩五味子三兩地骨皮三兩

茯苓三兩防風三兩橘皮三兩慈石三兩

本草
防已七ネカラ
又アラカワ

碎綿裹

甘草二兩 冬

凡十四味切以水一斗二升煮取三升絞去滓分溫

三四服之如去八九里覆取微潤五日服一劑以

三四劑為斷忌黏食生冷 子五九 ナレシク ヒエ ヒヤカ九モウ

又云主骨蒸肺痿手足煩熱兼湯或不能令蘆

根飲方

蘆根切十兩 ヤリ他个 麥門冬十兩 去皮 地骨白皮十兩 生薑

十兩切 伏苓 伏苓五兩 橘皮五兩 兼服石骨

中寒虛脹痛者加吳茱萸八兩 カラハヒトカラ

凡六味切以水二斗煮取八升絞去滓分溫五服盡三服夜二服忌如藥法

又云主骨蒸肺痿四體煩熱不能食口乾者麥門冬

飲方

麥門冬三升

去心生者二升

地骨白皮三升

小麥五升

凡三味以水一斗三升煮小麥取一升去麥肉二

味更煮取三升絞去滓以溫三服之相去四五

里

又云小龍膽丸療骨蒸身熱手足煩心中懊憹羸

於報及悔也又於交會也

瘦不能食方

セシクセヌカクナクモ

龍膽五、黃連

去毛

芍藥、甘草

黃蘗

大黃

黃芩

本丸

人參

支子人

各四分

凡九味搗篩蜜丸飲服三九、如梧子稍加以

知為度日二三服忌如法

又玄骨蒸之病元問男女特忌房室舉動勞作尤

不宜食陳臛

アル

臛

酸難消

アル

粘食

牛馬

驢羊

大小

豆

猪魚油膩

アル

酒

麴

菜

野鳥

之屬

葵

笋

蒜

蕨

及

生冷等

ヒエツル

並不得食

唯宜食

煮飯

塹

豉

豆

將

胃

燒薑

麥、粟、豆、小豆、

芝麻、

麥、

粟、

豆、

小豆、

芝麻、

麥、

粟、

豆、

小豆、

芝麻、

葱薤苟杞クコ苜蓿モウモ苦菜地黃葉牛膝菜並須爛ハシ

煮食之ヌクモ假病稍退肌膚虛弱者莫六及松六及可時食于廉脯ホシ

又云主骨逆逆及眩痺氣等灸方

兩肩井 上廉 下廉 灸七壯

又方夾脊兩傍各相去一寸二分肋兩乳下一夫助助間灸

前法

廣清方療骨蒸軍方肺氣每至日晚即惡如

寒壯熱顏色微赤不能下食日漸羸瘦方

生地黃三兩切葱白二兩切香豉二兩童子小便二升

甘草二兩炙

右地黄等於小便中浸一宿平晨煎去滓アタヒ未カシチ

滓澄去定取一升二合分溫三服忌食熱麵猪ヤキコサ

肉油シ、アフラウヤ臘子ヤク粘食

又云療瘦病方

靈天蓋一大兩免人頂骨麝香半香モラセネ桃人一大抄去皮

生朱沙一兩半者光明好琥珀一大天升乾之

右五味各別搗篩訖然後搗和合調トウヘ每晨

空腹以小兒小便半升和散方寸匕服ツモ忌盡

廣利方理骨節熱積漸黃瘦方

欬カク甲六分カク知母チモ四支チシ大黃オホシ六分オホシ葱白キナシ五莖キナシ

十二分カク赤棗根白皮八分カク甘草四分カク

切以童子小便一大升三合煎取ハ合去滓食

後良久分溫三服相去如人行七八里頓服

五割忌熱肉アツキ麵人アツキ莧

又方大黃四分切以童子小便五合煎取四合去滓空腹

分溫兩服相去如人行四五里頓服五割忌熱肉

麵

治肺痿方第十五四

氣主皮毛故易傷於風邪

病源論云肺主氣為五藏上蓋風邪傷於府藏

而面氣虛弱又目勞侵大汗アセアエ出或經大下而巨津液ウシナフ

々々竭絕ツマユエ肺氣擁塞不能宣通諸藏之氣日成

肺萎也其病欬唾而喘シラキハキナ乾沫而小便不利逆進沫小便乾是也欬唾咽燥欬者必愈故救而不能者難

治

廣利方療肺痿唾膿面腥臭連々ハキ賴不止漸持ナドクセク

羸瘦形容枯槁傾秦許及賴也方

紫菀駱子頭廿一枚元桔梗十二分皮炙天門冬八分

伏苓十二分十生百合三枚洗生地黃汁天合湯成下

知母六分

切以水二大升煮取九合食後良久分溫三服

如人行五六里進一服カナラシ要利加硃硝八分湯

成下忌一切熱肉ハキコ アブラツメル麵油膩菓子鯉魚

玄感傳屍方主肺痿嗽嗽瀕上氣不得卧夕黏唾

等寫肺湯方

亭歷子三兩

亭カハヲホネヌアタカナアシナツタハセリ
痰火熱令紫
色揭如泥之

大棗廿枚

破

桑根白皮

三兩

切

凡三味以水三升煮桑及桑皮取一升去滓

內事歷子証如渾丸許挽令消散更煮三

八減一調トウ冷暖頃服之良久當吐キ惡物利

一五行如湯浚雪即得安卧神効 忌生冷

鹹酸腥臭油腹シハナク 凡クナエクセク アフワットル等

又云肺痿骨蒸司燥氣若吐而聲破或多唾或

口乾兼渴不能食單脹小便方

又云肺痿骨蒸氣若吐血聲破或多唾或乾

兼湯不能食單脹小便方

單脹自身及他人小便百日即瘳日四服一服

一升

集驗方治肺委欬吐涎沫不上咽^{ハイヲタリアハ}燥而不渴^{ウメトカハナル}方

生薑五兩 人參三兩 甘草四兩 炙大棗十五

枚^ハ擘


凡四物以水七升煮取三升分三服

今案千金方
甘草三兩大

棗十枚

醫心方卷第十三

光康



醫心方卷第十三札記

二頁上 菊子千金作菊范子 荊子千金作荊桂子 八頁上 一升千金

作二 二日千金作日二 將湏千金湏作慎昏二字 十二頁一

升千金作二升 二升千金作三升 十四頁 白末千金作末白 五

又方漿煮千金漿下有水字 十五頁 五升千金作三升 下六 牀

米外臺作粳米 九 僧深方外臺引深師勞下無藏慮 十

二頁上 于薑外臺作生薑 一兩外臺兩下有美字 三 三升外臺此下有內

藥羹取三 六 在陰病源在作則 廿一頁 殭姦外臺引蘇遊論

此下有氣急歎者名曰肺痿 八行 吳楚云此注外臺大書

也作巴勞齊也三
字作極勞二字
行九
受氣
外臺受下
飲少
外臺飲

字
上廿二頁
龜
外臺作
陰沛
外臺沛
行二
忙悸
外臺

悸下有
心字
行五
皆悲紅赤
外臺無皆字赤下有
如傳相脂又時六字
行六
有時

外臺作
時
氣微弱
外臺氣下
行八
氣時
外臺氣下
憤

外臺作
憤
行九
起行
外臺作
行下一
欲頻
外臺頻
行二

終曹夢
外臺終作朝暮二
字夢下有常字
行三
好卧睡
外臺好作
至於二字
行四

文時
外臺文
行五
腹腸
外臺腸
上廿四頁
廣濟方療瘦

病
外臺載此方
行下九
志沫
外臺志
上廿五頁
紙裏
外臺

裏
裏作
行四
五章
外臺作
生血肉
下廿六頁
連脾
外臺引霍
戎脾作脾
七

頁上
必困
外臺困
作曰

書
卷
之
一
上
色

・

醫心方 三 日本古典全集之内

編纂者 正 宗 敦 夫

發行者 東京市豊島區長崎東町三丁目一六一
合資會社 日本古典全集刊行會

代表社員 長 嶋 東 一

東京市芝區金杉新橋町一二

印刷者 單式印刷株式會社 和田助一

發行所 東京市豊島區長崎東町三丁目六一
合資會社 日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

【非賣品】

昭和十年三月十五日印刷
昭和十年三月廿五日發行








UNIVERSITY OF TORONTO
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER
COLLECTION

*purchased from
a gift by*

THE DONNER CANADIAN
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4827

